



# Base de datos y referencias para una estrategia basada en evidencia

Respuesta estratégica  
actualizada al VIH y el SIDA de  
Argentina: hacia el acceso  
universal a la prevención,  
tratamiento, atención y apoyo

Periodo 2008-2011

Revisado Abril 2009



Este documento está dirigido a los directores de programas, planificadores, y epidemiólogos; quienes entienden la importancia de tener compilados los datos epidemiológicos dentro de una base de datos.

Esta base de datos y referencias presentan en forma sistemática y sencilla los resultados de las investigaciones, publicaciones y reportes estadísticos que han sido colectados, destacando solo la información relevante (lugar del estudio, prevalencia, tamaño de la muestra, intervalos de confianza, pruebas estadísticas, entre otras). Información adicional como metodología, limitante o interpretaciones analíticas, han sido excluidas por razones de conveniencia.

Para realizar un análisis secundario o desarrollar una síntesis epidemiológica, puede necesitar consultar el documento fuente, de donde se originan los datos; para ello el documento de referencia, en su sección bibliográfica, está en capacidad de proveer esta información, en forma comprensible y detallada.”

La metodología supone una revisión constante de la base de datos y referencias.

## Observación Técnicas del Grupo de trabajo

En este trabajo se pretendió sistematizar la información disponible, en nuestro país, sobre algunos aspectos comportamentales y sobre la incidencia/prevalencia de la infección por VIH y otras ITS en las poblaciones vulnerables.

Observamos que algunas características fueron comunes entre los grupos, no solamente porque las personas pudieran pertenecer a más de un grupo sino también porque las situaciones que generan vulnerabilidad son comunes independientemente del grupo al cual pertenezcan o con el cual se identifiquen. Aunque esto no quiere decir que algunas características particulares de ciertos grupos los expone mayormente al riesgo de infección del VIH. Como es el caso de los hombres que tienen sexo con hombres.

La información obtenida resulta parcial dada las dificultades de acceso a la información en cada una de estas poblaciones (en diferente grado de acuerdo al grado de vulnerabilidad).

Sobre la base de la información recabada se observa lo siguiente:

- Se ha encontrado evidencia para los siguientes grupos vulnerables: hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras del sexo, personas privadas de Libertad. También se recopiló información de población general, personas con VIH y embarazadas
- En la población de embarazadas se analizó un estudio cuantitativo con cuestionario estructurado realizado en base a la selección de conglomerados urbanos con población de >500.000 habitantes en Argentina. La información proviene fundamentalmente de personas que viven en los siguientes lugares: CABA, Conurbano Bonaerense, La Plata, Gran Mendoza, Mar del Plata, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Tucumán. Se incluyeron mujeres embarazadas a partir de la semana 20 de gestación y se llevaron a cabo encuestas ponderadas por localidad.
- Se analizaron un total de seis estudios en hombres que tienen sexo con hombres, la mayoría se llevó a cabo mediante encuestas abiertas. En cuatro estudios se midió prevalencia, aunque es importante tener en cuenta que en dos de ellos no se incluyeron a aquellas personas que ya conocían el diagnóstico y por lo tanto la prevalencia está subestimada. Solo hubo un estudio con un diseño prospectivo para la estimación de incidencia. Los estudios analizados en HSH corresponden a una población heterogénea, debido a que en algunos se incluye a las personas transexuales, travestis y transgénero dentro de esta categoría, sin embargo cabe destacar que la identidad sexual es autorreferencial con las limitaciones que ello implica. Los contextos en cuanto a la situación social, económica y de vulnerabilidad no son equiparables e inclusive, la información disponible en nuestro país evidencia que las dificultades planteadas en cuanto a situaciones de violencia, consumo de drogas, prevalencia de VIH y de otras ITS son marcadamente diferentes para las personas trans. En general la información proviene de estudios observacionales de corte transversal o de encuestas cuali-cuantitativas y la mayoría de la población incluida es de Buenos Aires (y

particularmente de la CABA) por lo que la representatividad de la muestra se circunscribe fundamentalmente a esta área geográfica.

- Con respecto a la población Trans se analizaron un total de cuatro estudios de los cuales la mayoría se llevo a cabo mediante encuestas abiertas, en tres de ellos se informo prevalencia. En dos estudios se obtuvieron datos en áreas geográficas diferentes a Buenos Aires y Capital Federal (Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chaco, Corrientes, Tucumán, Santa Fe, y Jujuy). El tamaño muestral en el caso de las trans fue significativamente menor comparado con los otros subgrupos. Se destaca la referencia a problemas medico legales, lo cual contribuye, significativamente al estado de vulnerabilidad de esta población donde las situaciones de violencia y la condición de extranjeras ilegales dificultan el escenario de denuncia. La mayoría de la población incluida es de Buenos Aires y particularmente de la CABA por lo que la representatividad de la muestra se circunscribe fundamentalmente a esta zona, aunque dado el carácter migratorio de esta población es dificultoso establecer a que grupo se puede aplicar la información obtenida. No hay datos acerca del comportamiento migratorio de las trans. La mayor parte de la población ingresada fue joven (promedio de 29 años) económicamente activa, con un bajo porcentaje de trabajo formal, una alta prevalencia de trabajo sexual y escasa utilización información sobre el uso del preservativo a pesar de reconocerlo como un método eficaz de cuidado. La prevalencia de infección por VIH y otras ITS es significativamente mayor con respecto a las otras sub-poblaciones.
- Para la población de usuarios de drogas (UDs) se analizaron un total de cinco estudios de los cuales, la mayoría se llevo a cabo mediante encuestas abiertas. Algunos de ellos midieron prevalencia. Se obtuvieron datos de áreas geográficas diferentes a Buenos Aires y Capital Federal (Rosario, Córdoba, Misiones, Mendoza, Bariloche, M del plata y Neuquén). En esta población se observan dos grupos con comportamiento diferenciado: los más añosos que participaron desde el inicio, en los programas de reducción de daños, con prácticas vinculadas a la prevención y al cuidado en el consumo; y los más jóvenes que refieren menor participación en estas estrategias. También hay que destacar el cambio en la composición de esta población vinculado a la disminución al consumo de drogas endovenosas en grupo con un aumento en el consumo individual y con menor proporción de personas que consumen drogas endovenosas. Una alta proporción de las personas encuestadas manifestó un bajo nivel de conocimiento sobre el VIH.
- En la población de trabajadores sexuales (TS) se analizaron un total de 4 estudios de los cuales la mayoría se llevo a cabo mediante encuestas abiertas. Algunos de ellos midieron prevalencia, y ninguno informo incidencia. Si bien las investigaciones se llevaron a cabo en CABA, Conurbano, Rosario, Córdoba y Mendoza, la mayor parte de la información proviene de trabajadores/as sexuales del AMBA. Algunos estudios incluían a otros grupos vulnerables pero en esta sección analizaremos por separado a los trabajadores/as sexuales. La mayoría de los estudios que incluyen encuesta se realizaron en mayores de 18

años ya que el trabajo en menores se consideró explotación infantil y no fue analizado en los estudios revisados. En general la información proviene de estudios observacionales de corte transversal o encuestas cuali-cuantitativas. Ninguno de los estudios informo incidencia y la mayoría de la población incluida es de Buenos Aires y particularmente de Capital federal por lo que la representatividad de la muestra se circunscribe fundamentalmente a esta zona. Sin embargo el número de participantes de otras provincias fue mayor si lo comparamos con otros grupos vulnerables. A pesar de que la mayoría tuvo un inicio del trabajo sexual en temprana edad, existe poca información sobre las personas menores de 18 años dado que esta condición no se considera trabajo sexual sino explotación. El hecho de que la mayor parte de los trabajos se realizaron con personas que trabajan en la calle es difícil extrapolar las conclusiones al trabajo en domicilio sobre todo en lo que se refiere a variables comportamentales. Los problemas medico legales constituyen un ítem que contribuye significativamente al estado de vulnerabilidad de esta población y que es dado fundamentalmente por la violencia y la situación de extranjeras ilegales que dificultan el escenario de denuncia. Una situación particular es la provincia de Mendoza donde, es frecuente que a la persona que está detenida se le realice controles de salud y el test del VIH en forma compulsiva.

- Población privada de la libertad Existe muy poca información publicada sobre la población carcelaria que permita conocer datos sobre variables comportamentales. Si bien comparte algunas características con otros grupos es importante generar información propia de esta población en particular. La prevalencia detectada fue variando a lo largo de los años, desde un 19.9% en el año 2001 con un descenso significativo en el año 2004 a 5.7%, hasta 3.78 en el año 2008. La mayoría de los que tienen diagnostico de infección por VIH son de sexo masculino (85.3%). Esta información no fue incluida en el documento debido a que la misma no fue publicada y no se conoce metodología y circunstancias en la que se genero dicha información.

La metodología de cada uno de los estudios encontrados y las áreas geográficas sometidas a investigación son diferentes. Por lo tanto, no se puede asumir que dichas prevalencias sean representativas de todo el país. Sin embargo, el análisis de situación debe tener en cuenta estos datos y sus limitantes.

Estas limitantes para contar con datos representativos a nivel nacional constituye un reto importante a superar al hacer los ejercicios de estimaciones y proyecciones de la epidemia de VIH.

A pesar de que los estudios fueron muy heterogéneos, la información puede ser útil como guía para el diseño de nuevas investigaciones, y para la elaboración de estrategias futuras de prevención del VIH y otras ITS.

# Índice

<b>OBSERVACIÓN TÉCNICAS DEL GRUPO DE TRABAJO.....</b>	<b>4</b>
<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>12</b>
<b>RECONOCIMIENTOS .....</b>	<b>14</b>
<b>METODOLOGÍA.....</b>	<b>14</b>
<b>METODOLOGÍA.....</b>	<b>15</b>
<b>INVENTARIO DE EVIDENCIAS.....</b>	<b>16</b>
<b>INCIDENCIA .....</b>	<b>17</b>
INCIDENCIA DE VIH .....	17
<i>Hombres que tienen sexo con hombres.....</i>	<i>17</i>
<b>PREVALENCIAS.....</b>	<b>17</b>
PREVALENCIA DE VIH.....	17
<i>Embarazadas .....</i>	<i>17</i>
<i>Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).....</i>	<i>17</i>
<i>Usuarios de drogas.....</i>	<i>19</i>
<i>Trabajadores/as sexuales.....</i>	<i>19</i>
<i>Población Trans.....</i>	<i>20</i>
PREVALENCIA DE SÍFILIS .....	21
<i>Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).....</i>	<i>21</i>
<i>Trabajadores/as sexuales.....</i>	<i>22</i>
<i>Población Trans.....</i>	<i>22</i>
PREVALENCIA DE VIRUS HEPATITIS B .....	22
<i>Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).....</i>	<i>22</i>
<i>Trabajadores/as sexuales.....</i>	<i>23</i>
<i>Población Trans.....</i>	<i>24</i>
PREVALENCIA DE HEPATITIS C .....	24
<i>Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).....</i>	<i>24</i>
<i>Trabajadores/as sexuales.....</i>	<i>25</i>
<i>Población Trans.....</i>	<i>25</i>
<b>PRUEBA DEL VIH.....</b>	<b>26</b>
¿SOLICITÓ TURNO PARA REALIZARSE LA PRUEBA DEL VIH, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES? .....	26
PERSONAS QUE SE REALIZARON ALGUNA VEZ LA PRUEBA DEL VIH .....	26
<i>Usuarios de drogas.....</i>	<i>26</i>
<i>Trabajadoras/es sexuales.....</i>	<i>27</i>
<i>Población General.....</i>	<i>27</i>
PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE RECIBIERON CONSEJERÍA PRE Y POST TEST .....	28
<i>Personas con VIH .....</i>	<i>28</i>
PERSONAS QUE COMENTARON CON ALGUIEN EL RESULTADO DE LA PRUEBA DEL VIH DEL ÚLTIMO AÑO 30	
<i>Población General.....</i>	<i>30</i>
PERSONAS A LAS QUE SE LES OFRECIÓ EL TEST DEL VIH .....	31
<i>Embarazadas .....</i>	<i>31</i>
PROMEDIO DE EDAD EN LA QUE RECIBIERON EL DIAGNOSTICO DE VIH .....	31
<i>Personas con VIH .....</i>	<i>32</i>
PERSONAS A LAS QUE LES RESULTÓ FÁCIL O DIFÍCIL ENCONTRAR UN LUGAR PARA REALIZARSE LA PRUEBA DEL VIH.....	32
<i>Usuarios de drogas.....</i>	<i>32</i>
CONOCIMIENTO DE UN LUGAR DÓNDE HACERSE LA PRUEBA DE VIH.....	34
<i>Usuarios de drogas.....</i>	<i>34</i>
<i>Población general.....</i>	<i>34</i>
PERSONAS QUE FUERON A BUSCAR EL RESULTADO DE LA PRUEBA DEL VIH.....	35
<i>Usuarios de drogas.....</i>	<i>35</i>

PERSONAS QUE SI HUBIERAN TENIDO O TUVIERON UN RESULTADO POSITIVO HABRÍAN SABIDO O SABÍAN DÓNDE CONCURRIR PARA TRATARSE O CONSULTAR .....	36
<i>Usuarios de drogas</i> .....	36
<i>Población general</i> .....	37
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE HIZO EL TEST ...	38
<i>Personas con VIH</i> .....	39
<b>CONOCIMIENTO .....</b>	<b>42</b>
CONOCIMIENTO DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH .....	42
<i>Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)</i> .....	42
<i>Usuarios de drogas</i> .....	42
<i>Trabajadores/as Sexuales</i> .....	45
<i>Población General</i> .....	45
CONOCIMIENTO DE LOS MODOS DE PROTEGERSE DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH .....	48
<i>Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)</i> .....	48
<i>Usuarios de drogas</i> .....	49
<i>Trabajadores/as Sexuales</i> .....	50
<i>Población general</i> .....	50
INFORMACIÓN ACERCA DEL GRADO EN QUE VARÍA EL RIESGO DE INFECCIÓN DEL VIH/SIDA.....	53
<i>Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)</i> .....	53
GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE VIH/SIDA.....	54
<i>Población general</i> .....	54
INFORMACION SOBRE ITS - QUE ITS CONOCE? .....	56
<i>Usuarios de drogas</i> .....	56
<i>Trabajadores/as Sexuales</i> .....	58
GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE SÍNTOMAS DE ITS .....	58
<i>Población General</i> .....	58
<i>Usuarios de drogas</i> .....	60
MEDIDAS QUE PUEDE TOMAR UNA MUJER SI SABE QUE SU PAREJA TIENE UNA ITS, SEGÚN SEXO Y EDAD .....	60
<i>Población general</i> .....	60
FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE VIH.....	63
<i>Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)</i> .....	63
PERCEPCIONES EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA.....	63
¿EXISTE ALGÚN TRATAMIENTO PARA EL VIH/SIDA? .....	64
<i>Hombres que tienen sexo con hombres</i> .....	64
PERCEPCIONES EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA.....	64
<i>Hombres que tienen sexo con hombres</i> .....	64
MUJERES QUE RECIBIERON INFORMACIÓN O CONSEJOS SOBRE EL VIH EN EL MOMENTO DE LOS CONTROLES .....	65
<i>Mujeres embarazadas</i> .....	65
<b>COMPORTAMIENTO .....</b>	<b>67</b>
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN AUTO NOMINACIÓN SEXUAL .....	67
<i>Personas con VIH</i> .....	67
PAREJAS SEXUALES: TIPO DE PAREJA ACTUAL, SEGÚN SEXO Y EDAD.....	68
<i>Población General</i> .....	69
TIPO DE PAREJAS SEXUALES EN EL ÚLTIMO AÑO .....	70
<i>Población General</i> .....	70
CANTIDAD DE PAREJAS SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS .....	72
<i>Población General</i> .....	72
CANTIDAD DE PAREJAS SEXUALES DIFERENTES MANTENIDAS EN EL ÚLTIMO AÑO.....	73
<i>Usuario de drogas</i> .....	73
NUMERO DE PAREJAS SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES .....	76
<i>Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)</i> .....	76
<i>Población Trans</i> .....	76
NUMERO DE PAREJAS EN LA ÚLTIMA SEMANA .....	76
<i>Hombres que tienen sexo con hombres</i> .....	76
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN SEXO DE LAS PERSONAS CON QUIENES TUVO RELACIONES SEXUALES A LO LARGO DE SU VIDA POR AUTO NOMINACIÓN SEXUAL .....	77



<i>Personas con VIH</i> .....	77
ENCUESTADOS QUE CONVIVEN O ESTÁN EN PAREJA. DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO SEROLÓGICO DE LA PAREJA.....	78
<i>Personas con VIH</i> .....	78
PERSONAS QUE CONVIVEN ACTUALMENTE CON SU PAREJA .....	79
<i>Población General</i> .....	79
<i>Población General</i> .....	79
EDAD DE COMIENZO DE LA CONVIVENCIA CON PAREJA ACTUAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD .....	80
<i>Población General</i> .....	80
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA (INICIADA SEXUALMENTE) SEGÚN PRACTICAS SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR REGIÓN .....	82
<i>Personas con VIH</i> .....	82
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA (INICIADOS SEXUALMENTE) SEGÚN PRACTICAS SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR ORIENTACIÓN SEXUAL.....	83
<i>Personas con VIH</i> .....	83
INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES - PERSONAS QUE MANTUVIERON RELACIONES SEXUALES ALGUNA VEZ.....	84
<i>Población general</i> .....	84
EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES.....	85
<i>Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)</i> .....	85
<i>Usuarios de droga</i> .....	85
<i>Población Trans</i> .....	87
<i>Población General</i> .....	87
PERSONAS QUE HICIERON ALGO PARA EVITAR CONTRAER EL SIDA DESDE QUE ESCUCHARON HABLAR DEL TEMA .....	90
<i>Población general</i> .....	90
TIPO DE CONDUCTAS ADOPTADAS PARA EVITAR CONTRAER EL VIH .....	91
<i>Población general</i> .....	91
PERSONAS QUE BUSCARON ALGÚN TIPO DE TRATAMIENTO CUANDO TUVIERON SÍNTOMAS DE ITS, SEGÚN SEXO Y EDAD .....	93
<i>Población general</i> .....	93
USO DE DROGAS - FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE DROGAS ENDOVENOSAS .....	94
<i>Usuarios de drogas</i> .....	94
EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO POR VÍA INYECTABLE.....	95
<i>Usuarios de drogas</i> .....	95
LA ÚLTIMA VEZ QUE TE INYECTASTE, ¿USASTE AGUJA/JERINGA USADA ANTES POR OTRO? .....	95
<i>Usuarios de drogas</i> .....	95
FRECUENCIA CON LA QUE COMPARTIERON EQUIPOS DE INYECCIÓN.....	96
<i>Usuarios de drogas</i> .....	96
LIMPIEZA DE AGUJAS Y JERINGAS .....	96
<i>Usuarios de drogas</i> .....	97
MATERIAL DE LIMPIEZA DE AGUJAS Y JERINGAS.....	97
<i>Usuarios de drogas</i> .....	97
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EQUIPO NUEVO, NO USADO, CUANDO LO NECESITA .....	97
<i>Usuarios de drogas</i> .....	97
CAUSAS DE INFECCIÓN DEL VIH - SITUACIÓN POSIBLE DE INFECCIÓN POR VIH INFORMADA POR ELLOS	98
<i>Personas con VIH</i> .....	98
<b>USO DEL PRESERVATIVO .....</b>	<b>100</b>
USO PRESERVATIVO EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL.....	100
<i>Población general</i> .....	100
USO DEL PRESERVATIVO EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL CON PAREJAS ESTABLES .....	101
<i>Usuarios de drogas</i> .....	101
<i>Población general</i> .....	102
USO DE PRESERVATIVO EN LA ULTIMA RELACIÓN SEXUAL CON PAREJA ESTABLE. QUIEN SUGIRIÓ USAR PRESERVATIVO?.....	103
<i>Usuarios de drogas</i> .....	103
USO DE PRESERVATIVO EN LA ULTIMA RELACIÓN SEXUAL CON PAREJA OCASIONA .....	104
<i>Usuario de drogas</i> .....	104

USO DE PRESERVATIVO EN LA ULTIMA RELACIÓN SEXUAL CON PAREJA OCASIONAL. ¿QUIEN SUGIRIÓ USAR PRESERVATIVO? .....	106
<i>Usuario de drogas</i> .....	106
MOTIVO POR EL QUE NO UTILIZO PRESERVATIVO EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL CON PAREJA OCASIONAL.....	107
<i>Usuario de drogas</i> .....	107
<i>Población general</i> .....	109
USO DE PRESERVATIVO LA ÚLTIMA VEZ QUE MANTUVIERON RELACIONES POR DINERO O DROGAS.....	110
<i>Usuario de drogas</i> .....	110
USO DE PRESERVATIVO EN LA ÚLTIMA RELACIÓN POR DINERO O DROGAS QUIEN SUGIRIÓ USAR PRESERVATIVO?.....	112
<i>Usuario de drogas</i> .....	112
FRECUENCIA DE USO DE PRESERVATIVO EN EL ÚLTIMO AÑO CON PAREJAS ESTABLES .....	113
<i>Población general</i> .....	113
FRECUENCIA DE USO DE PRESERVATIVO EN EL ÚLTIMO AÑO CON PAREJAS OCASIONALES .....	115
<i>Población general</i> .....	115
QUIEN SUGIRIÓ EL USO DEL PRESERVATIVO LA ULTIMA VEZ EN LA PAREJA ESTABLE .....	117
<i>Población general</i> .....	117
QUIEN SUGIRIÓ EL USO DEL PRESERVATIVO LA ULTIMA VEZ EN LA PAREJA OCASIONAL .....	119
<i>Población general</i> .....	119
PORCENTAJE QUE TUVIERON RELACIONES SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES QUE USARON SIEMPRE PRESERVATIVO PARA DIFERENTES PRACTICAS SEXUALES POR ORIENTACIÓN SEXUAL .....	120
<i>Personas con VIH</i> .....	120
USO DEL PRESERVATIVO EN LA ULTIMA RELACIÓN SEXUAL .....	121
<i>Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)</i> .....	121
<i>Población Trans</i> .....	122
<i>Usuarios de drogas</i> .....	123
PORCENTAJE QUE NO UTILIZARON INCONSCIENTEMENTE EL PRESERVATIVO EN SUS RELACIONES SEXUALES SEGÚN MOTIVOS PARA NO USO POR ORIENTACIÓN SEXUAL.....	123
<i>Personas con VIH</i> .....	123
MOTIVO POR EL QUE NO UTILIZO PRESERVATIVO EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL CON PAREJA ESTABLE .....	125
<i>Usuario de drogas</i> .....	125
<b>ATENCIÓN Y TRATAMIENTO .....</b>	<b>129</b>
ANÁLISIS DE CD4 Y CARGA VIRAL EN LOS ÚLTIMOS 12 Y 18 MESES POR REGIÓN .....	129
<i>Personas con VIH</i> .....	129
FRECUENCIA DE CONCURRENCIA A CONSULTA MEDICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES .....	130
<i>Personas con VIH</i> .....	130
COMIENZO DE TARV .....	131
<i>Personas con VIH</i> .....	131
PERIODO EN QUE COMENZARON TARV POR REGIÓN .....	132
<i>Personas con VIH</i> .....	132
<b>ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN .....</b>	<b>134</b>
PORCENTAJE QUE DECLARAN HABER SUFRIDO RECHAZO O DISCRIMINACIÓN DE PARTE DE ALGÚN FAMILIAR, AMIGO/A, COMPAÑEROS/AS DE TRABAJO .....	134
<i>Poblacion General</i> .....	134
PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN .....	135
<i>Personas con VIH</i> .....	135
PORCENTAJE QUE DECLARARON HABERSE SENTIDO DISCRIMINADOS EN SERVICIOS DE SALUD.....	137
<i>Personas con VIH</i> .....	137
GRADO DE TRADICIONALIDAD EN ACTITUDES HACIA EL GENERO Y LA HOMOSEXUALIDAD .....	139
<i>Población General</i> .....	139
GRADO DE DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS CON SIDA .....	141
<i>Usuario de drogas</i> .....	141
<b>ESTADISTICAS NACIONALES .....</b>	<b>143</b>
<b>POLITICAS NACIONALES (MARCO JURIDICO).....</b>	<b>144</b>
NACIONALES: .....	144

<i>Catamarca</i> .....	145
<i>Ciudad Autónoma de Buenos Aires</i> .....	145
<i>CORDOVA</i> .....	145
<i>CORRIENTES:</i> .....	145
<i>CHACO</i> .....	145
<i>CHUBUT</i> .....	146
<i>ENTRE RIOS</i> .....	146
<i>FORMOSA</i> .....	146
<i>JUJUY</i> .....	146
<i>LA PAMPA</i> .....	146
<i>LA RIOJA</i> .....	146
<i>MENDOZA</i> .....	146
<i>MISIONES</i> .....	146
<i>NEUQUEN</i> .....	146
<i>RIO NEGRO</i> .....	146
<i>SALTA</i> .....	146
<i>SAN JUAN</i> .....	147
<i>SAN LUIS</i> .....	147
<i>SANTA CRUZ</i> .....	147
<i>SANTA FE</i> .....	147
<i>SANTIAGO DEL ESTERO</i> .....	147
<i>TIERRA DEL FUEGO</i> .....	147
<i>TUCUMAN</i> .....	147
<b>BIBLIOGRAFIA CONSULTADA</b> .....	<b>148</b>
<b>AUTORES</b> .....	<b>150</b>
<b>ACRÓNIMOS</b> .....	<b>151</b>
<b>ANEXOS: TABLAS Y GRAFICAS</b> .....	<b>152</b>

## Presentación

Los cambios en la historia natural de la infección por VIH/sida y el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos han impactado tanto en el período de incubación como en la morbi-mortalidad asociada a la enfermedad.

La vigilancia epidemiológica, centrada inicialmente en el análisis de los casos de sida, aportó información importante pero no suficiente para el diseño de estrategias preventivas eficaces, especialmente en países, como la Argentina, donde, desde el inicio, se planteó garantizar la accesibilidad a los medicamentos en las personas afectadas.

Estos cambios han llevado a la necesidad de implementar nuevos sistemas de vigilancia que permitan conocer las características de la población infectada más recientemente y las tendencias de la epidemia.

La vigilancia epidemiológica de segunda generación, permite conocer cambios en el comportamiento y en la prevalencia de la infección en poblaciones vulnerables, a través de la información producida por estudios comportamentales y sitios centinelas.

En este marco, se recopiló, en esta sistematización la información disponible, sobre estudios comportamentales, con o sin datos de prevalencia, producida en nuestro país, en los últimos diez años, con el objeto de acumular en documento único la información disponible sobre la respuesta nacional a la epidemia. La que ayudará a la sistematización de la información que el país produce y a su vez en la creación de un mapa de información que se posee o que debe construirse.

Se jerarquizaron los estudios que aportan datos sobre poblaciones vulnerables y con resultados que sirvan como insumos para optimizar las estimaciones poblacionales y las estrategias de prevención.

### Definiciones

- Población Vulnerable: de acuerdo a los términos referidos por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH sida (ONUSIDA), consideraremos para este análisis como poblaciones vulnerables a aquellas personas y-o comunidades que en términos del resultado de un rango de factores externos, ven reducida su capacidad para evitar el riesgo de infección por VIH. Estos factores pueden incluir: (1) Factores ligados al desconocimiento o a la carencia de las herramientas que se requieren para protección de si mismo y de otros; (2) factores correspondientes a la calidad y cobertura de servicios (Ej.: inaccesibilidad a los servicios debido a la distancia, costo u otros factores); y (3) factores sociales tales como las violaciones de los derechos humanos o de las normas sociales y culturales. Las normas pueden incluir prácticas, creencias y leyes que estigmatizan y

subestiman ciertas poblaciones, limitando su capacidad de acceso o uso de métodos de prevención, tratamiento, cuidado y soporte de servicios. Estos factores solos o en combinación pueden crear o exacerbar la vulnerabilidad para la transmisión del VIH en forma individual o colectiva.

Atendiendo a esta definición la información incluida en esta sistematización abarcará las siguientes poblaciones: Hombres que tienen sexo con hombres (HSH), usuarios de drogas (UD), población trans, trabajadoras/es sexuales (TS), embarazadas, población general y personas con VIH.

A pesar de cada uno de estos grupos será analizado en forma separada, el análisis conjunto de algunos subgrupos con características compartidas ayudará a plantear mejores estrategias de salud en base a la información obtenida.

## Reconocimientos

En la elaboración del presente documento, se ha contado con la participación de un equipo técnico y de instituciones liderados por la Dirección SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual.

Nuestro agradecimiento al Ministerio de Salud Dirección SIDA que a través de sus representantes, Claudio Bloch, Ariel Adaszko, Adriana Duran, han participado en este proceso.

Queremos agradecer a ASAP de ONUSIDA especialmente a Cesar Nuñez, Rosalía Rodríguez-García, Andrea Boccardi Vidarte, Rubén Mayorga, Gabriela de la Iglesia, y Clarisa Brezzo.

A los consultores ASAP Michel Eric Gaillard, Cesar Galindo, Olivier Gregoire, Javier Jahnsen, y Javier Toibaro y por su acompañamiento y aportes en la elaboración de este documento.



**Dirección de sida  
y Enfermedades de  
transmisión sexual**



MINISTERIO *de* SALUD  
PRESIDENCIA *de la* NACIÓN

## Metodología

**Población objetivo:** Se recopiló la información disponible en estudios comportamentales con o sin datos de prevalencia-incidencia en relación a la infección del VIH e ITS en las poblaciones vulnerables de Argentina teniendo en cuenta las diferentes áreas geográficas del país.

Se ingresó la información disponible en una base de datos, para lo cual se tuvieron en cuenta estudios publicados, información de los proyectos llevados a cabo por las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el contexto de las actividades del Fondo Global de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria en Argentina, literatura no publicada o literatura gris cuya fuente de información fue confiable (para lo cual fueron contactados los autores de los trabajos).

**Variabes:** Se consideró para la sistematización la información sobre los autores, tipo de estudio, año de realización, área geográfica, prevalencia e incidencia de infección por VIH, tamaño de la muestra y variables comportamentales. Se presentaron los datos en orden consecutivo según el año de terminación del estudio.

**Criterios de Inclusión:** estudios comportamentales realizados durante los últimos 10 años preferentemente con datos sobre prevalencia e incidencia de infección por VIH de las poblaciones vulnerables en Argentina.

**Criterios de exclusión:** se excluyeron los estudios que la Dirección de SIDA y ETS consideró no tenían representatividad de la población estudiada, ya sea por la cantidad de participantes o por la metodología utilizada.

**Estadística:** se realizó estadística descriptiva teniendo en cuenta el aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo de cada una de las variables.

## Inventario de Evidencias

Tab.: 1 Panorama de evidencia en grupos prioritarios del PEN

Población	PEN	UNGASS	Prevalencia				CCC			
			VIH	Sífilis	Hepatitis B	Hepatitis C	Prueba de VIH	conocimiento	comportamiento	Uso del condón
Mujeres Embarazadas	√		+				+			
HSH	√		+	+	+	+		+	+	+
Usuarios de drogas	√						+	+	+	+
TS	√		+	+	+	+	+	+	+	+
Personas privadas de libertad	√									
Trans	√		+	+	+	+				+
Comunidades aborígenes										
Personas viviendo con VIH	√							+	+	+
Población general	√						+	+	+	+
Evidencia	+		Evidencia limitada							



## **Incidencia**

### ***Incidencia de VIH***

#### ***Hombres que tienen sexo con hombres***

**2003.** Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (M Segura, 2003). 7.5%.  
**3.9/100** personas año (IC: 2.0-6.7). Seguimiento: 1 año N: 877

## **Prevalencias**

### ***Prevalencia de VIH***

#### ***Embarazadas***

**2006-2008.** Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Salomón, 2008).  
**0.46%** (40/8600) N= 8600.

#### ***Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)***

**2000-2001.** Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Pando, a, 2003).  
**13.8%** (IC 11.4-16.7). N=694

Por ITS N= 694.

Con ITS: **21.1%**

Sin ITS: **11.5%** (OR=2.06 (IC1.27-3.32)).

Por edad: N= 694

< 29 años: **10.6%** (35/360) OR 1.00

30–39 años: **22.1 %** (52/235) OR 2.64 (1.66–4.20)

40–49 años: **12.5 %** (8/64) OR 1.33 (0.58–3.01)

>50 años: **2.9%** (1/35) OR 0.27 (0.04–2.06)

Por uso de drogas N= 694

UDs: **16.7 %** (21/126) OR 1.31 (0.75–2.29)

No UDs: **13.2%** (75/568)

Por Situación Laboral N= 694

Empleados: **12.3%** (73/593) OR 2.10 (1.20–3.66)

Desempleados: **22.8%** (23/101)

Por Trabajo sexual N= 694  
Si: **27.3%** (3/11) OD 2.38 (0.40–10.12)  
No: **13.6%** (93/683)

Intercambio de sexo por dinero, drogas o comida no auto  
referenciado como trabajo sexual N= 683  
Si: **22.2%** (8/36) OD 1.89 (0.77–4.52)  
No: **13.1%** (85/647)

Por número de parejas N=694  
0–1: **12.5%** (67/537) OD 1.00  
2–5: **17.8 %** (21/118) OD 1.52 (0.89–2.60)  
>5: **19.4 %**(7/36 ) OD 1.69 (0.71–4.02)

Por utilización de preservativo  
Uso de preservativo con pareja estable N= 371  
Regular: **20.8%** (30/144)  
Irregular: **12.3%** (28/227) OD 0.53 (0.29–0.97)  
Uso de preservativo con pareja HIV positiva N= 50  
Regular: **18.8%:** (6/32)  
Irregular: **38.9** ( 7/18) OD 2.76 (0.63–12.35)  
Uso de preservativo con pareja HIV negativo N= 105  
Regular: **20.4%** (9/44)  
Irregular: **4.9%** (3/61) OD 0.20 (0.03–0.89)  
Uso de preservativo con pareja HIV desconocidos N= 216  
Regular: **22.1%** (15/68)  
Irregular: **12.2%** (18/148) OD 0.49 (0.22–1.11)

**2000-2001.** Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Pando b, 2006).

Por nivel educativo: N= 694  
Educación Superior: **12.2 %**(40/328)  
Educación Secundaria: **14.4 %** (48/333)  
Educación Primaria: **24.2 %** (8/33)

**2003.** Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Segura, 2003).  
**7.5%.**

**2006.** Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Pando, 2007)  
**10.4%** (IC 8-12.7). N= 1034.  
Por consumo de drogas: N= 705  
UDs: **12.6%**  
No UD: **8.2%**.

**2007.** AMBA, Rosario, Bariloche, Mar del plata y Córdoba. (Barrón, 2008)  
**15%. N=307.**

**2006-2008.** Buenos Aires, Santiago del Estero, Salta y Paraná. (Salomón,  
2008).  
**11.8%** (188/1590) (IC: 10.2-13.4). N= 1590.

Por ciudad:

Buenos Aires: **11.6%** (181/1560) (IC: 10-13.2) N= 1560

Santiago del Estero: **22.7%** (5/22) (IC: 7.8-45.4) N= 22.

Salta: **33.3%** (2/6) (IC: 4.3-77.7) N= 6

Paraná: **0%** (0/2). N= 2

## *Usuarios de drogas*

**2006-2007.** Buenos Aires. (Pando, 2007)

**6.7%** (IC 3.8 -9.5). N= 1034.

**2007.** AMBA, Rosario, Bariloche, M del plata y Córdoba. (Barron, 2007).

**15%** (39/261) N= 261

**2006-2008.** Buenos Aires, Rosario, La Plata y Tucumán. (Salomón, 2008).

**4.8 %** (31/647) (IC: 3.1-6.5), N= 647.

Por sexo

En hombres: **5.8%** (24/417) (IC: 3.4-8)

En mujeres: **3.0%** (7/230) (IC: 0.6-5.5)

Por uso o no uso de drogas: N= 536.

En personas que usaron alguna vez drogas inyectables: **5.3%**  
(26/494)

En personas que no usaron alguna vez drogas inyectables:  
**11.9%** (5/42)

Por sexo N= 536

En hombres: **7.1%** (24/338)

En mujeres: **3.5%** (7/198)

## *Trabajadores/as sexuales*

**2000-2002.** Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Salta.  
(Pando, 2006)

**3.2%** (20/625) (IC: 2-5). N= 625

Por ciudad

Buenos Aires: **3.4%** (10/296) (IC: 1.7-6.3) N= 296.

La Plata: **1%** (1/100) (IC: 0.1-6.8) N= 100.

Córdoba: **2.3%** (2/86) (IC: 0.4-8.9) N= 86.

Rosario: **0%** (0/12) N= 12

Mendoza: **6.1%** (2/33) (IC: 1.1-21.6) N= 33

Salta: **5.1%** (5/98) (IC: 1.9-12.1) N= 98

**2006-2008.** Buenos Aires, Santiago del Estero, Viedma, Rosario, Paraná,  
Córdoba, La Plata y Mendoza. (Salomón, 2008).

**5.4%** (74/1368) (IC: 4.2-6.6) N= 1368.

Por ciudad:

Buenos Aires: **8%** (24/301) (IC: 4.7-11.2) N= 301.  
Santiago del Estero: **14.3%** (6/42) (IC: 2.5-26.1) N= 42.  
Viedma: **0%** (0/1) N= 1  
Rosario: **80%** (4/5) (IC: 28.3-99.5) N= 5  
Córdoba: **55.8%** (20/52) (IC: 41.3-70.2) N= 52.  
La plata: **13.8%** (9/65) (IC: 4.7-23) N= 65

Por sexo: N= 1368.

En hombres: **22.8%**(53/232) (IC: 17.2-28.5) N= 232  
En mujeres: **1.8%**(21/1136) (IC: 1.0-2.7). N= 1136

Por área geográfica y sexo:

Buenos Aires. N= 257

En hombres: **12.5%** (4/32) (IC: 3.5-29) N= 32

En mujeres: **4.4%**(10/225) (IC: 1.5-7.4) N= 225

Santiago del Estero. N= 119.

En hombres: **15.4%** (2/13) (IC: 1.9-45.4) N=13

En mujeres: **0.94%** (1/106) (IC: 0.0024-5.1)N= 106

Viedma. N= 25

En hombres: **0%** (0/1) N= 1

En mujeres: **0%** (0/24) N= 24

Rosario. N= 40

En hombres: – **sin dato**

En mujeres: **0%** (0/40) N= 40

Paraná. N= 29

En hombres: - **sin dato**

En mujeres: **6.9%** (2/29) (IC: 0.85-22.8) N= 29

Córdoba. N= 160

En hombres: **0%** (0/2) N= 2

En mujeres: **3.8%** (6/158) (IC: 0.5-7.1) N= 158

La Plata. N= 412.

En hombres: **13.7%** (7/51) (IC: 3.3-24.1) N= 51

En mujeres: **0.28%** (1/361) (IC: 0.007-1.5) N= 361

Mendoza. N= 160

En hombres: **0%** (0/13) N= 13

En mujeres: **0.68%** (1/147) (IC: 0.02-3.7) N= 147

## ***Población Trans***

**2006.** Buenos Aires. (Pené, 2006).

**34.47%** (IC: 30.04-39.11) N= 455.

**2007.** AMBA, Rosario, Bariloche, M del plata y Córdoba. (Barron, 2007)

**15%.** N= 88

**2002-2008.** Buenos Aires. (Toibaro, 2008)

**27.6%.** N= 108

**2006-2008.** Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario, Córdoba y La Plata. (Salomón, 2008).

**34.2%** (40/117) (IC: 25.2-43.2) N= 117.

Por ciudad

Buenos Aires. **45.4%** (10/22) (IC: 22.4-68.5) N= 22.

Santiago del Estero **13.3%**(4/30) (IC: 3.7-30.7) N= 30.

Rosario **80%**(4/5) (IC: 28.4-99.5) N= 5.

Córdoba **40%** (20/50) (IC: 25.4-54.6) N=50.

La Plata **20%** (2/10) (IC: 2.5-55.6) N= 15

## **Prevalencia de Sífilis**

### **Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)**

**2000-2001.** Buenos Aires. (Pando, 2006)

. **16.9%** IC14.1-20. N= 662

Por edad:

< 30 años: **11.8%** (41/346)

30–39 años: **21.7%** (48/221)

40–49 años: **19.4%** (12/62)

> 50 años: **33.3%** (11/33)

Por nivel educativo:

Educación Superior: **12.9 %** (40/309)

Educación Secundaria: **20.1 %** (65/323)

Educación Primaria: **23.3 %** (7/30)

Por Situación Laboral:

Empleados: **15.3%** (87/567)

Desempleados: **26.3%** (25/95)

Por Trabajo sexual

Si: **50.0%** (4/8)

No: **16.5%** (108/654)

Intercambio de sexo por dinero, drogas o comida no auto referenciado como trabajo sexual

Si: **27.3%** (12/44)

No: **16.2%** (100/618)

Por número de parejas:

0–1: **14.3%** (74/518)

2–5: **26.1%** (29/111)

>5: **28.1%** (9/32)

Por Utilización del preservativo

Uso de preservativo con pareja estable N= 354

Regular: **12.4 %** (17/137)

Irregular: **13.8 %**(30/217)

Uso de preservativo con pareja ocasional: N= 662

Regular: **14.2%** (44/310)

Irregular: **19.3%** (68/352)

Por Adicción a drogas: N= 662

UDs: **16.6%** (91/547)

No UDs: **18.3%** (21/115)

### *Trabajadores/as sexuales*

**2000-2002.** Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Salta. (Pando, 2006).

**45.7%** (273/598) (IC: 41.6-49.7). N= 598

Por ciudad:

Buenos Aires **42.2%** (114/270) (IC: 36.3-48.4) N= 270

La Plata: **29%** (29/100) (IC: 20.6-39.1) N= 100

Córdoba: **45.3%** (39/86) (IC: 34.7-56.4) N= 86

Rosario: **16.7%** (2/12) (IC: 2.9-49.1) N= 12

Mendoza: **40.6%** (13/32) (IC: 24.2-59.2) N= 32

Salta: **77.6%** (76/98) (IC: 67.8-85.1) N= 98

**2006-2008.** Buenos Aires, Santiago del Estero, Viedma, Rosario, Paraná, Córdoba, La Plata y Mendoza. (Salomón, 2008).

Por sexo:

En hombres: **19.8%** (22/111) (IC: 11.9-27.7)

En mujeres: **22.9%** (238/1040) (IC: 20.3-25.5). N= 1151.

### *Población Trans*

**2002-2008.** Buenos Aires. (Toibaro, 2008)

**42.3%** (22/52). N= 108

**2006-2008.** Buenos Aires, Rosario, La Plata y Tucumán. (Salomón, 2008).

**62.7%** (64/102) (IC: 52.9-72.6). N= 102.

## *Prevalencia de virus hepatitis B*

### *Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)*

**2000-2001.** Buenos Aires. (Pando, 2006).

**37.7%** (257/681) (IC: 34.1-41.5) N= 681

Por edad: N= 681

< 30 años: **27.2%** (97/357)

30-39 años: **47.4%** (108/228)

40-49 años: **48.4%** (30/62)

> 50 años: **64.7%** (22/34)

Por nivel educativo: N= 681

Educación Superior: **38.9 %** (124/319)

Educación Secundaria: **36.4 %** (120/330)

Educación Primaria: **40.6 %** (13/32)

Por situación Laboral: N= 681

Empleados: **36.9 %** (215/582)  
Desempleados: **42.4 %** (42/99)

Por trabajo sexual: N= 681  
Si: **37.9 %** (254/670)  
No: **27.3 %** (3/11)

Intercambio de sexo por dinero, drogas o comida no auto referenciado como trabajo sexual N= 681  
Si: **37.1%** (235/634)  
No: **46.8%** (22/47)

Por número de parejas: N= 681  
0-1: **37.2%** (197/530)  
2-5: **41.2%** (47/114)  
>5: **36.1%** (13/36)

Por utilización del preservativo N= 681  
Uso de preservativo con pareja estable N= 362  
Regular **43.3%** (61/141)  
Irregular **36.2%** (80/221)

Uso de preservativo con pareja ocasional N= 681  
Regular **39.3%** (125/318)  
Irregular **36.4%** (132/363)

Por Adicción a drogas N= 681  
UDs: **47.9%** (57/119)  
No UDs: **35.6%** (200/562)

## *Trabajadores/as sexuales*

**2000-2002.** Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Salta. (Pando,2006).

**14.4%** (87/602) (IC: 11.8-17.6) N= 602

Por ciudad

Buenos Aires: **17.9%** (49/274) (IC: 13.6-23.1) N= 274

La Plata: **13%** (13/100) (IC: 7.4-21.6) N= 100

Córdoba: **14%** (12/86) (IC: 7.7-23.5) N= 86

Rosario: **8.3%** (1/12) (IC: 0.4-40.2)N= 12

Mendoza: **0%** (0/32) N= 32

Salta: **12.2%** (12/98) (IC: 6.8-20.8) N= 98

**2006-2008.** Buenos Aires, Santiago del Estero, Viedma, Rosario, Paraná, Córdoba, La Plata y Mendoza. (Salomón, 2008)

Por sexo.

Prevalencia de HBs N= 151.

En hombres: **0%** (0/71)

En mujeres: **1.3%** (1/80) (IC: 0.03-6.7)

Prevalencia de Anti core N= 142.  
En hombres: **20%** (16/80) (IC: 10.6-29.4)  
En mujeres: **1.6%** (1/62) (IC: 0.04-8.7)

## *Población Trans*

**2006-2008.** Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santiago del Estero y La plata.  
(Salomón, 2008). N= 108

HBs: **3.7%** (4/108) (IC: 1.02-9.2)  
Anti core: **29.9%** (32/107) (IC: 20.8-39.5)

## **Prevalencia de Hepatitis C**

### *Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)*

**2000-2001.** Buenos Aires. (Pando, 2006).  
(Antígeno de superficie y/o anticuerpo anticore positivos): **37.7%**  
(257/681) (IC: 34.1-41.5) N= 681

Por grupo de edad

< 30 años: **0.8%** (3/357)  
30–39 años: **3.5%** (8/228)  
40–49 años: **1.6%** (1/62)  
> 50 años: **2.9%** (1/34).

Por nivel educativo

Educación Superior: **0.9%** (3/319)  
Educación Secundaria: **2.7%** (9/330)  
Educación Primaria: **3.1%** (1/32)

Por situación Laboral

Empleados: **1.4%** (8/582)  
Desempleados: **5.1%** (5/99)

Por trabajo sexual

Si: **27.3%** (3/11)  
No: **1.5%** (10/670)

Por intercambio de sexo por dinero, drogas o comida no auto  
referenciado como trabajo sexual:

Si: **10.6%** (5/47)  
No: **1.3%** (8/634)

Por número de parejas:

0–1: **37.2%** (197/530)  
2–5: **41.2%** (47/114)  
>5: **36.1%** (13/36)

Por utilización del preservativo

Uso de preservativo con pareja estable N= 362  
Regular: **0.0%** (0/141)  
Irregular: **2.3%** (5/221)



Uso de preservativo con pareja ocasional: N= 681  
Regular: **1.6%** (5/318)  
Irregular: **2.2%** (8/363)  
Por adicción a drogas:  
UDs: **5.9%** (7/119)  
No UDs: **1.1%** (6/562)

## *Trabajadores/as sexuales*

**2000-2002.** Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Salta.  
(Pando, 2006).

**4.3%** (26/602) (IC: 2.9-6.4). N= 602

Por ciudad:

Buenos Aires: **4.4%** (12/274) (IC: 2.4-7.7) N=274

La Plata: **2%** (2/100) (IC: 0.3-7.7) N= 100

Córdoba: **2.3%** (2/86) (IC: 0.4-8.9) N= 86

Rosario: **0%** (0/12) N= 12

Mendoza: **6.3%** (2/32) (IC: 1.1-22.2) N= 32

Salta: **8.2%** (8/98) (IC: 3.8-15.9) N= 98

**2006-2008.** Buenos Aires, Santiago del Estero, Viedma, Rosario, Paraná, Córdoba, La Plata y Mendoza. (Salomón, 2008)

Por sexo:

En hombres: **5%** (4/80) (IC: 1.4-12.3)

En mujeres: **0%** (0/70)

## *Población Trans*

2006-2008. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santiago del Estero y La plata  
**3.7%** (4/108) (IC: 1.02-9.2) N: 108 (Salomón, 2008)

## Prueba del VIH

*¿Solicitó turno para realizarse la prueba del VIH, en los últimos doce meses?*

### *Hombres que tienen sexo con hombres*

**2008.** AMBA Rosario, Córdoba, Mar del Plata , Bariloche. Barrón López, 2007  
N=307

No, nunca: **10%**  
Hace más de 12 meses: **25%**  
Si: **65%**

### *Personas que se realizaron alguna vez la prueba del VIH*

#### *Usuarios de drogas*

**2007.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Méndez, 2008)N=355

Global.

Realizaron el test: **56.1%**  
No realizaron el test: **43.2%**  
Ya tenia diagnostico de VIH: **0.6%**

Según participación en programas de reducción de daños  
Participaron en el programa de reducción de daños

Realizaron el test: **71.8%**  
No realizaron el test: **28.2%**

No participaron en el programa de reducción de daños

Realizaron el test del VIH: **48.6%**  
No realizaron el test del VIH: **50.5%**  
Ya tenia diagnostico de VIH: **0.9%**

Por sexo

Masculino N=253

Realizaron el test: **51.3%**  
No realizaron el test: **47.4%**  
Ya tenia diagnostico de VIH: **0.8%**

Femenino N=57

Realizaron el test: **75.4%**  
No realizaron el test: **24.6%**  
Ya tenia diagnostico de VIH: **0.7%**

Por grupo de edad

Hasta 24 años. N=153  
Realizaron el test: **45.8%**  
No realizaron el test: **53.6%**  
Ya tenia diagnostico de VIH: **0.9%**

25-34 años. N=111  
Realizaron el test: **67.6%**  
No realizaron el test: **31.5%**

35 años y más N= 46  
Realizaron el test: **63%**  
No realizaron el test: **37%**

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta N=34  
Realizaron el test: **38.2%**  
No realizaron el test: **61.8%**

Primaria completa-secundaria incompleta N= 207  
Realizaron el test: **53.2%**  
No realizaron el test: **45.4%**  
Ya tenia diagnostico de VIH: **1%**

Secundaria completa y más. N=69  
Realizaron el test: **72.5%**  
No realizaron el test: **27.5%**

## *Trabajadoras/es sexuales*

**2007.** Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza Paraná Comas, Alicia.2008  
N=415

Conoce algún lugar donde se realiza la prueba del VIH: **89.7%**  
Se hizo el análisis en alguna oportunidad: **92.8%**

Frecuencia se hicieron el test:

cada 6 meses: **36.4%**  
Una vez por año: **26.2%**  
Menos seguido: **18.2%**  
Llegó a saber el resultado: **99%**

Situaciones de discriminación al momento de realizarse el test: **7.8%**

Se violó la privacidad del resultado: **3.7%**  
Personas Sometidas a un análisis sin su consentimiento: **4,8%**

## *Población General*

**2008.** Nacional (Jorrat, 2008)

Total: N=4000  
Si: **51%** No: **49%**

Por sexo:

Masculino: N=1995  
Si: **44%** No: **56%**  
Femenino: N=2005  
Si: **59%** No: **41%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=492  
Si: **13%** No: **87%**  
20 a 24: N=745  
Si: **46%** No: **54%**  
25 a 34: N=1123  
Si: **67%** No: **33%**  
35 a 44: N=765  
Si: **66%** No: **34%**  
45 a 54: N=543  
Si: **51%** No: **49%**  
55 a 69: N=332  
Si: **34%** No: **66%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=226  
Si: **34%** No: **66%**  
Primaria completa / secundaria incompleta: N=1644  
Si: **43%** No: **56%**  
Secundaria completa: N=883  
Si: **56%** No: **44%**  
Terciaria incompleta / secundaria incompleta: N=699  
Si: **55%** No: **45%**  
Terciaria completa / universitaria completa: N=548  
Si: **71%** No: **29%**

Por nivel de ingreso familiar

Nivel bajo: N=2038  
Si: **48%** No: **52%**  
Nivel medio: N=1377  
Si: **54%** No: **46%**  
Nivel alto: N=585  
Si: **60%** No: **40%**

## ***Porcentaje de encuestados que recibieron consejería pre y post test***

### ***Personas con VIH***

**2006. Nacional.** (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Hasta 2001: N= 518

Recibió consejería pre test: **19.7%**

Recibió consejería post test: **53.1%**

2002 en mas: N=323

Recibió consejería pre test: **24.8%**

Recibió consejería post test: **68.1%**

Por área geográfica:

AMBA

Hasta 2001: N= 293

Recibió consejería pre test: **23.5%**

Recibió consejería post test: **55.6%**

2002 en mas: N=193

Recibió consejería pre test: **26.9%**

Recibió consejería post test: **71.5%**

Pampeana:

Hasta 2001: N= 119

Recibió consejería pre test: **9.2%**

Recibió consejería post test: **37.0%**

2002 en mas: N=56

Recibió consejería pre test: **19.6%**

Recibió consejería post test: **60.7%**

Cuyo Patagonia:

Hasta 2001: N= 45

Recibió consejería pre test: **15.6%**

Recibió consejería post test: **51.1%**

2002 en mas: N=15

Recibió consejería pre test: **19.6%**

Recibió consejería post test: **60.7%**

NOA:

Hasta 2001: N= 27

Recibió consejería pre test: **29.6%**

Recibió consejería post test: **81.5%**

2002 en mas: N=33

Recibió consejería pre test: **18.2%**

Recibió consejería post test: **69.7%**

NEA:

Hasta 2001: N= 34

Recibió consejería pre test: **20.6%**

Recibió consejería post test: **67.6%**

2002 en mas: N=26

Recibió consejería pre test: **11.5%**

Recibió consejería post test: **61.5%**

## **Personas que comentaron con alguien el resultado de la prueba del VIH del último año**

### **Población General**

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008)

Total: N=848

Si: **87%**; No: **13%**

Por sexo:

Masculino: N=354

Si: **86%**; No: **14%**

Femenino: N=494

Si: **89%**; No: **11%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=44

Si: **89%**; No: **11%**

20 a 24: N=175

Si: **87%**; No: **13%**

25 a 34: N= 335

Si: **89%**; No: **11%**

35 a 44: N=184

Si: **88%**; No: **12%**

45 a 54: N=86

Si: **85%**; No: **15%**

55 a 69: N=24

Si: **75%**; No: **25%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=25

Si: **80%**; No: **20%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=316

Si: **87%**; No: **13%**

Secundaria completa: N=198

Si: **87%**; No: **13%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N= 163

Si: **88%**; No: **12%**

Terciaria completa / universitaria completa: N=146

Si: **88%**; No: **12%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: N=423

Si: **89%**; No: **11%**

Nivel medio: N=304

Si: **84%**; No: **15%**

Nivel alto: N=121

Si: **89%**; No: **11%**

## **Personas a las que se les ofreció el test del VIH**

### **Embarazadas**

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008)

Total: N=828

Si: **74%**; No: **25%**; Ns/nc: **1%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=29

Si: **83%**; No: **17%**; Ns/nc: **0%**

20 a 24: N=151

Si: **81%**; No: **19%**; Ns/nc: **0%**

25 a 34: N=410

Si: **76%**; No: **23%**; Ns/nc: **1%**

35 a 44: N=197

Si: **69%**; No: **30%**; Ns/nc: **1%**

45 a 54: N= 41

Si: **56%**; No: **44%**; Ns/nc: **0%**

55 a 69: N= **No aplica**

Por nivel de instrucción

Primaria incompleta: N=43

Si: **49%**; No: **51%**; Ns/nc: **0%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=339

Si: **74%**; No: **25%**; Ns/nc: **1%**

Secundaria completa: (N=184

Si: **75%**; No: **25%**; Ns/nc: **0%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=116

Si: **84%**; No: **15%**; Ns/nc: **1%**

Terciaria completa / universitaria completa: N=146

Si: **74%**; No: **25%**; Ns/nc: **1%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: (N=476)

Si: **73%**; No: **26%**; Ns/nc: **1%**

Nivel medio: N=262

Si: **76%**; No: **24%**; Ns/nc: **0%**

Nivel alto: N=90

Si: **77%**; No: **21%**; Ns/nc: **2%**

### **Promedio de edad en la que recibieron el diagnóstico de VIH**

## *Personas con VIH*

**2006.** Nacional. (Proyecto de actividades de apoyo para la prevención y control del VIH/Sida en la Argentina. 2008)

Total: N=841

Mujer: **29.7%**

Varón heterosexual: **30.3%**

GBT: **31.4%**

Por región geográfica:

AMBA: N=486

Mujer: **30.2%**

Varón heterosexual: **30.9%**

GBT: **32.1%**

Pampeana: N=175

Mujer: **28.2%**

Varón heterosexual: **27.0%**

GBT: **31.8%**

Cuyo Patagonia: N=60

Mujer: **28.0%**

Varón heterosexual: **27.9%**

GBT: **28.3%**

NOA: N=60

Mujer: **30.3%**

Varón heterosexual: **32.7%**

GBT: **30.9%**

NEA: N=60

Mujer: **31.2%**

Varón heterosexual: **30.7%**

GBT: **29.9%**

## ***Personas a las que les resultó fácil o difícil encontrar un lugar para realizarse la prueba del VIH***

### *Usuarios de drogas*

**2007.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2008) N: 174

Fácil: **87.4%**

Difícil: **5.2%**

Ni fácil ni difícil **6.9%**

No sabe no contesta **0.6%**

Según participación en programas de reducción de daños

Participaron en el programa de reducción de daños N: 56

Fácil: **89.3%**

Difícil: **1.8%**



Ni fácil ni difícil **8.9%**  
No sabe no contesta **0%**  
No participaron en el programa de reducción de daños N: 108  
Fácil: **88%**  
Difícil: **1.74 %**  
Ni fácil ni difícil **3.7%**  
No sabe no contesta **0%**

Por sexo:

Masculino N: 131  
Fácil: **87.8%**  
Difícil: **5.3%**  
Ni fácil ni difícil: **6.1%**  
No sabe no contesta: **0.8%**  
Femenino N: 43  
Fácil: **86%**  
Difícil: **4.7%**  
Ni fácil ni difícil: **9.3%**  
No sabe no contesta: **0%**

Por grupo de edad:

Hasta 24 años. N: 70  
Fácil: **88.6%**  
Difícil: **5.7%**  
Ni fácil ni difícil: **5.7%**  
No sabe no contesta: **0%**  
25-34 años. N: 75  
Fácil: **88%**  
Difícil: **2.7%**  
Ni fácil ni difícil: **8%**  
No sabe no contesta: **1.3%**  
35 años y más N: 29  
Fácil: **82.8%**  
Difícil: **10.3%**  
Ni fácil ni difícil: **6.9%**  
No sabe no contesta: **0%**

Por nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta N: 13  
Fácil: **76.9%**  
Difícil: **7.7%**  
Ni fácil ni difícil: **15.4%**  
No sabe no contesta: **0%**  
Primaria completa-secundaria incompleta N: 111  
Fácil: **84.7%**  
Difícil: **5.4%**  
Ni fácil ni difícil: **9%**  
No sabe no contesta: **0.9%**  
Secundaria completa y más: N: 50  
Fácil: **96%**

Difícil: **4%**  
Ni fácil ni difícil: **0%**  
No sabe no contesta: **0%**

## **Conocimiento de un lugar dónde hacerse la prueba de VIH**

### *Usuarios de drogas*

**2007.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2008)

Total: N=310

No sabían: **32.4%**; Sabían: **64.4%**; No contesta: **3.2%**

Por sexo

Masculino N= 131

No sabían: **87.8%**; Sabían: **5.3%**; No contesta: **0.8%**

Femenino N: 43

No sabían: **86%**; Sabían: **4.7%**; No contesta: **0%**

Por edad

Hasta 24 años. N= 70

No sabían: **86%**; Sabían: **4.7%**; No contesta: **0%**

25-34 años. N: 75

No sabían: **88%**; Sabían: **2.7%**; No contesta: **1.3%**

35 años y más N: 29

No sabían: **82.8%**; Sabían: **10.3%**; No contesta: **0%**

Por nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta N=13

No sabían: **76.9%**; Sabían: **7.7%**; No contesta: **15.4%**

Primaria completa-secundaria incompleta N= 111

No sabían: **84.7%**; Sabían: **5.4%**; No contesta: **9%**

Secundaria completa y más. N: 50

No sabían: **96%**; Sabían: **4%**; No contesta: **0%**

### *Población general*

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008)

Total: N=3027

Si: **83%**; No: **16%**; Ns/nc: **1%**

Por sexo:

Masculino: N=1482

Si: **80%**; No: **19%**; Ns/nc: **1%**

Femenino: N=1545  
Si: **85%**; No: **13%**; Ns/nc: **2%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=331  
Si: 67%; No: **31%**; Ns/nc: **2%**

20 a 24: N=597  
Si: **79%**; No: **19%**; Ns/nc: **2%**

25 a 34: N=930  
Si: **87%**; No: **12%**; Ns/nc: **1%**

35 a 44: N=609  
Si: **87%**; No: **12%**; Ns/nc: **1%**

45 a 54: N=376  
Si: **85%**; No: **14%**; Ns/nc: **1%**

55 a 69: N=184  
Si: **83%**; No: **14%**; Ns/nc: **3%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=164  
Si: **70%**; No: **29%**; Ns/nc: **1%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=1243  
Si: **78%**; No: **21%**; Ns/nc: **1%**

Secundaria completa: (N=660)  
Si: **84 %**; No: **15%**; Ns/nc: **1%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=550  
Si: **87%**; No: **12%**; Ns/nc: **1%**

Terciaria completa / universitaria completa: N=410  
Si: **93%**; No: **5%**; Ns/nc: **2%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: N=1560  
Si: **80%**; No: **19%**; Ns/nc: **1%**

Nivel medio: (N=1016)  
Si: **84%**; No: **5%**; Ns/nc: **1%**

Nivel alto: (N= 451)  
Si: **87%**; No: **11%**; Ns/nc: **2%**

## ***Personas que fueron a buscar el resultado de la prueba del VIH***

### ***Usuarios de drogas***

**2007.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2008)

Total N= 174

Fueron a buscar el resultado: **95.4%**

No fueron a buscar el resultado: **3.4%**

No contesta: **1.1%**

Por sexo:

Masculino N= 131

Fueron a buscar el resultado: **94.3%**

No fueron a buscar el resultado: **4.3%**

No contesta: **1.4%**

Femenino N= 43

Fueron a buscar el resultado: **97.3%**

No fueron a buscar el resultado: **2.7%**

No contesta: **0%**

Por edad

Hasta 24 años. N= 70

Fueron a buscar el resultado: **94.3%**

No fueron a buscar el resultado: **1.4%**

No contesta: **1.4%**

25-34 años. N= 75

Fueron a buscar el resultado: **97.3%**

No fueron a buscar el resultado: **2.7%**

No contesta: **0%**

35 años y más N= 29

Fueron a buscar el resultado: **93.1%**

No fueron a buscar el resultado: **3.4%**

No contesta: **1.1%**

Por nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta N= 13

Fueron a buscar el resultado: **100%**

No fueron a buscar el resultado: **0%**

No contesta: **0%**

Primaria completa-secundaria incompleta N= 111

Fueron a buscar el resultado: **93.7%**

No fueron a buscar el resultado: **4.5%**

No contesta: **1.8%**

Secundaria completa y más. N= 50

Fueron a buscar el resultado: **98.4%**

No fueron a buscar el resultado: **3.4%**

No contesta: **1.1%**

***Personas que si hubieran tenido o tuvieron un resultado positivo habrían sabido o sabían dónde concurrir para tratarse o consultar***

***Usuarios de drogas***

**2007.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2008)

Total: N= 174

Sabían donde concurrir: **73.6%**

No sabían donde concurrir: **20.6%**

No contesta: **5.7%**

Por sexo

Masculino N= 131

Sabían donde concurrir: **75.6%**

No sabían donde concurrir: **17.6%**

No contesta: **6.9%**

Femenino N= 43

Sabían donde concurrir: **67.4%**

No sabían donde concurrir: **30.2%**

No contesta: **2.3%**

Por grupo de edad

Hasta 24 años. N= 70

Sabían donde concurrir: **72.9%**

No sabían donde concurrir: **21.4%**

No contesta: **5.4%**

25-34 años. N= 75

Sabían donde concurrir: **70.7%**

No sabían donde concurrir: **24%**

No contesta: **5.3%**

35 años y más N= 29

Sabían donde concurrir: **82.9%**

No sabían donde concurrir: **10.3%**

No contesta: **6.9%**

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: N= 13

Sabían donde concurrir: **69.2%**

No sabían donde concurrir: **30.8%**

No contesta: **0%**

Primaria completa-secundaria incompleta: N= 111

Sabían donde concurrir: **73%**

No sabían donde concurrir: **18.9%**

No contesta: **8.1%**

Secundaria completa y más: N= 50

Sabían donde concurrir: **76%**

No sabían donde concurrir: **22%**

No contesta: **2%**

## ***Población general***

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008)

Total: N=4000

Si: **46%**; No: **53%**; Ns/nc: **1%**

Por sexo:

Masculino: (N=1995)

Si: **43%**; No: **56%**; Ns/nc: **1%**

Femenino: N=2005

Si: **49%**; No: **51%**; Ns/nc: **0%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=492

Si: **30%**; No: **70%**; Ns/nc: **0%**

20 a 24: N=745

Si: **39%**; No: **60%**; Ns/nc: **1%**

25 a 34: N=1123

Si: **49%**; No: **50%**; Ns/nc: **1%**

35 a 44: N=765

Si: **49%**; No: **51%**; Ns/nc: **1%**

45 a 54: N=543

Si: **54%**; No: **45%**; Ns/nc: **1%**

55 a 69: N=332

Si: **54%**; No: **45%**; Ns/nc: **1%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=226

Si: **34%**; No: **65%**; Ns/nc: **1%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=1644

Si: **39%**; No: **60%**; Ns/nc: **1%**

Secundaria completa: (N=883)

Si: **44%**; No: **55%**; Ns/nc: **1%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=699

Si: **51%**; No: **48%**; Ns/nc: **1%**

Terciaria completa / universitaria completa: N=548

Si: **66%**; No: **33%**; Ns/nc: **1%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: N=2038

Si: **42%**; No: **57%**; Ns/nc: **1%**

Nivel medio: N=1377

Si: **48%**; No: **52%**; Ns/nc: **0%**

Nivel alto: N=585

Si: **55%**; No: **44%**; Ns/nc: **1%**

### ***Porcentaje de la población encuestada según circunstancias en las que se hizo el test***

## Personas con VIH

**2006.** Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Total. N= 841

- En un análisis de rutina o chequeo: **32.6%**
- Tenia síntomas: **30.6%**
- Porque su pareja o persona con la que tuvo relaciones sexuales vivía con VIH: **13.6%**
- Durante una internación u operación: **11.4%**
- En un control de embarazo: **9.9%**
- Donación de sangre: **4.0%**
- Porque había tenido relaciones sexuales sin preservativo: **3.4%**
- Porque había compartido una jeringa al inyectarse drogas: **3.4%**
- Le hicieron el test a sus espaldas/ sin que lo pidiera: **2.0%**
- En un examen pre ocupacional u ocupacional: **1.2%**
- En un lugar de tratamiento por uso de drogas: **1.0%**
- En un examen prenupcial: **0.2%**
- Otros: **1.8%**
- NS: **2.9%**
- NC: **0.8**

Por región geográfica:

AMBA: N=486

- En un análisis de rutina o chequeo: **27.6%**
- Tenia síntomas: **33.5%**
- Porque su pareja o persona con la que tuvo relaciones sexuales vivía con VIH: **11.9%**
- Durante una internación u operación: **10.9%**
- En un control de embarazo: **9.1%**
- Donación de sangre: **3.7%**
- Porque había tenido relaciones sexuales sin preservativo: **2.3%**
- Porque había compartido una jeringa al inyectarse drogas: **3.1%**
- Le hicieron el test a sus espaldas/ sin que lo pidiera: **1.4%**
- En un examen pre ocupacional u ocupacional: **1.4%**
- En un lugar de tratamiento por uso de drogas: **1.4%**
- En un examen prenupcial: **0.2%**
- Otros: **1.2%**
- NS: **1.9%**
- NC: **0.8**

Pampeana: N=175

- En un análisis de rutina o chequeo: **37.1%**
- Tenia síntomas: **17.1%**
- Porque su pareja o persona con la que tuvo relaciones sexuales vivía con VIH: **17.1%**
- Durante una internación u operación: **10.3%**
- En un control de embarazo: **12.0%**
- Donación de sangre: **2.9%**

Porque había tenido relaciones sexuales sin preservativo: **7.4%**  
Porque había compartido una jeringa al inyectarse drogas: **6.3%**  
Le hicieron el test a sus espaldas/ sin que lo pidiera: **1.7%**  
En un examen pre ocupacional u ocupacional: **0.6%**  
En un lugar de tratamiento por uso de drogas: **0.6%**  
En un examen prenupcial: **0.0%**  
Otros: **2.3%**  
NS: **4.6%**  
NC: **1.1%**

Cuyo Patagonia: N=60

En un análisis de rutina o chequeo: **41.7%**  
Tenía síntomas: **20.0%**  
Porque su pareja o persona con la que tuvo relaciones sexuales vivía con VIH: **20.0%**  
Durante una internación u operación: **5.0%**  
En un control de embarazo: **15.0%**  
Donación de sangre: **3.3%**  
Porque había tenido relaciones sexuales sin preservativo: **1.7%**  
Porque había compartido una jeringa al inyectarse drogas: **5.0%**  
Le hicieron el test a sus espaldas/ sin que lo pidiera: **6.7%**  
En un examen pre ocupacional u ocupacional: **1.7%**  
En un lugar de tratamiento por uso de drogas: **0.0%**  
En un examen prenupcial: **0.0%**  
Otros: **1.7 %**  
NS: **3.3%**  
NC: **1.7%**

NOA: N=60

En un análisis de rutina o chequeo: **36.7%**  
Tenía síntomas: **41.7%**  
Porque su pareja o persona con la que tuvo relaciones sexuales vivía con VIH: **11.7%**  
Durante una internación u operación: **26.7%**  
En un control de embarazo: **10.0%**  
Donación de sangre: **5.0%**  
Porque había tenido relaciones sexuales sin preservativo: **0.0%**  
Porque había compartido una jeringa al inyectarse drogas: **0.0%**  
Le hicieron el test a sus espaldas/ sin que lo pidiera: **3.3%**  
En un examen pre ocupacional u ocupacional: **1.7%**  
En un lugar de tratamiento por uso de drogas: **0.0%**  
En un examen prenupcial: **0.0%**  
Otros: **3.3%**  
NS: **0.0%**  
NC: **0.0%**

NEA: N=60%

En un análisis de rutina o chequeo: **46.7%**  
Tenía síntomas: **45.0%**



Porque su pareja o persona con la que tuvo relaciones sexuales vivía con VIH: **11.7%**  
Durante una internación u operación: **10.0%**  
En un control de embarazo: **5.0%**  
Donación de sangre: **10.0%**  
Porque había tenido relaciones sexuales sin preservativo: **6.7%**  
Porque había compartido una jeringa al inyectarse drogas: **0.0%**  
Le hicieron el test a sus espaldas/ sin que lo pidiera: **1.7%**  
En un examen pre ocupacional u ocupacional: **0.0%**  
En un lugar de tratamiento por uso de drogas: **0.0%**  
En un examen prenupcial: **1.7%**  
Otros: **3.3%**  
NS: **8.3%**  
NC: **0.0%**

## Conocimiento

### Conocimiento de las formas de transmisión del VIH

#### *Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)*

**2007.** Bariloche Mar del Plata, Córdoba, Rosario y AMBA. (Barrón, 2008)  
“¿Cómo se transmite el VIH/sida” N=307

- Compartiendo agujas: **50%**
- Relaciones sexuales: **49%**
- Transfusiones de sangre: **44%**
- Tener sexo sin preservativo: **40%**
- Transmisión madre-hijo: **31%**
- Sangre (en general): **28%**
- Usando drogas: **18%**
- Fluidos corporales (en general): **15%**
- Semen: **8%**
- Relaciones homosexuales: **7%**
- Otros: **4%**

#### *Usuarios de drogas*

**2007,** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2008) N= 355

- Consumiendo drogas **12.1 %**
- Compartiendo. Equipo de inyección: **50.9 %**
- Relaciones Sexuales s/ especificar: **45.1%**
- Relaciones homosexuales: **13.5%**
- Sexo sin preservativo: **44.8%**
- Transfusiones: **27.9%**
- Transmisión madre-hijo: **18.4%**
- Por sangre: **69.3%**
- Por semen: **42.8%**
- Otro modo: **19%**

Por sexo:

Masculino. N=287

- Consumiendo drogas: **11.4 %**
- Compartiendo. Equipo de inyección: **49.6 %**
- Relaciones Sexuales s/ especificar: **45.7%**
- Relaciones homosexuales: **13.6%**
- Sexo sin preservativo: **44.3%**
- Transfusiones: **26.1%**

Transmisión madre-hijo: **16.4%**  
Por sangre: **70.4%**  
Por semen: **42.9%**  
Otro modo: **4.3%**

Femenino: N= 68

Consumiendo drogas: **14.7 %**  
Compartiendo. Equipo de inyección: **55.9 %**  
Relaciones Sexuales s/ especificar: **42.6%**  
Relaciones homosexuales: **13.2%**  
Sexo sin preservativo: **47.1%**  
Transfusiones: **35.3%**  
Transmisión madre-hijo: **26.6%**  
Por sangre: **64.7%**  
Por semen: **42.6%**  
Otro modo: **10.3%**

Por edad.

15-24 años: N= 153

Consumiendo drogas: **9.5 %**  
Compartiendo. Equipo de inyección: **45.6 %**  
Relaciones Sexuales s/ especificar: **44.2%**  
Relaciones homosexuales: **14.3%**  
Sexo sin preservativo: **48.9%**  
Transfusiones: **16.3%**  
Transmisión madre-hijo: **7.5%**  
Por sangre: **68%**  
Por semen: **40.8%**  
Otro modo: **3.4%**

25-34 años: N= 129

Consumiendo drogas: **12.5 %**  
Compartiendo. Equipo de inyección: **53.9 %**  
Relaciones Sexuales s/ especificar: **42.2%**  
Relaciones homosexuales: **14.8%**  
Sexo sin preservativo: **45.3%**  
Transfusiones: **31.3%**  
Transmisión madre-hijo: **20.3%**  
Por sangre: **70.3%**  
Por semen: **42.2%**  
Otro modo: **2.3%**

35 años y más N= 73

Consumiendo drogas: **16.4 %**  
Compartiendo. Equipo de inyección: **56.2 %**  
Relaciones Sexuales s/ especificar: **52.1%**  
Relaciones homosexuales: **9.6%**  
Sexo sin preservativo: **39.7%**  
Transfusiones: **45.2%**  
Transmisión madre-hijo: **37%**  
Por sangre: **69.9%**  
Por semen: **47.9%**  
Otro modo: **8.2%**

Por nivel educativo:

Hasta primaria incompleta N= 37

Consumiendo drogas: **26.5 %**

Compartiendo. Equipo de inyección: **50 %**

Relaciones Sexuales s/ especificar: **50%**

Relaciones homosexuales: **17.6%**

Sexo sin preservativo: **39.2%**

Transfusiones: **20.6%**

Transmisión madre-hijo: **8.8%**

Por sangre: **44.1%**

Por semen: **20.6%**

Otro modo: **2.9%**

Primaria completa-secundaria incompleta N= 244

Consumiendo drogas: **13.3%**

Compartiendo. Equipo de inyección: **50.4 %**

Relaciones Sexuales s/ especificar: **42.1%**

Relaciones homosexuales: **13.3%**

Sexo sin preservativo: **44.2%**

Transfusiones: **28.3%**

Transmisión madre-hijo: **17.1%**

Por sangre: **69.6%**

Por semen: **46.3%**

Otro modo: **6.3%**

Secundaria completa y más N= 74

Consumiendo drogas: **1.4 %**

Compartiendo. Equipo de inyección: **52.7 %**

Relaciones Sexuales s/ especificar: **52.7%**

Relaciones homosexuales: **12.2%**

Sexo sin preservativo: **61.8%**

Transfusiones: **29.7%**

Transmisión madre-hijo: **27%**

Por sangre: **79.7%**

Por semen: **41.9%**

Otro modo: **4.1%**

Por participación en programas de reducción de daños: N=83

Personas que participan en programa de reducción de daños:

Compartir el equipo de inyección: **54.9%**

Sexo sin preservativo: **46.3%**

Transmisión madre-hijo: **30.5%**

Personas que no participan en programa de reducción de daños:

N=255

Compartir el equipo de inyección: **48%**

Sexo sin preservativo: **46.3%**

Transmisión madre-hijo: **30.5%**

Medidas adoptadas por quienes hicieron algo para protegerse del VIH según participación en programas de reducción de daños

Personas que participaron en programas de reducción de daños

Usar Preservativo:	88.1%
No compartir el equipo de inyección:	25.4%
Personas que no participaron en programas de reducción de daños	
Usar Preservativo:	88.6%
No compartir el equipo de inyección:	16.3%

## *Trabajadores/as Sexuales*

**2007.** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad de Córdoba, Paraná, Rosario y ciudad de Mendoza. (Comas, 2008) N= 415

Información acerca de las vías de transmisión del VIH:

Relaciones sexuales (en general): **65.8%**  
 Relaciones sexuales sin preservativo: **30.8%**  
 Contacto con sangre infectada: **45.2%**  
 Compartiendo agujas o canutos: **24.8%**

Percepciones erróneas:

Por los mosquitos: **24.8%**  
 Compartiendo el mate: **11.9%**  
 Por la saliva: **3,6%**  
 Por los besos: **1,6%**.  
 El intercambio de saliva como vía de transmisión aparece en el **17.1%**

## *Población General*

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008)

Total: N=4000

Por relaciones sexuales: **92%**  
 Por contacto con sangre: **72%**  
 Por compartir equipo de inyección: **26%**  
 Por uso de drogas: **10%**  
 De madre a hijo: **8%**  
 Otra: **4%**  
 Ns/nc: **3%**

Por sexo:

Masculino: N=1995

Por relaciones sexuales: **91%**  
 Por contacto con sangre: **69%**  
 Por compartir equipo de inyección: **25%**  
 Por uso de drogas: **12%**  
 De madre a hijo: **6%**  
 Otra: **4%**  
 Ns/nc: **3%**

Femenino: N= 2005

Por relaciones sexuales: **93%**  
Por contacto con sangre: **74%**  
Por compartir equipo de inyección: **27%**  
Por uso de drogas: **9%**  
De madre a hijo: **9%**  
Otra: **3%**  
Ns/nc: **3%**

Por grupo de Edad:

15 a 19: N= 492

Por relaciones sexuales: **91%**  
Por contacto con sangre: **62%**  
Por compartir equipo de inyección: **25%**  
Por uso de drogas: **10%**  
De madre a hijo: **4%**  
Otra: **3%**  
Ns/nc: **5%**

20 a 24: N=745

Por relaciones sexuales: **92%**  
Por contacto con sangre: **74%**  
Por compartir equipo de inyección: **28%**  
Por uso de drogas: **10%**  
De madre a hijo: **7%**  
Otra: **3%**  
Ns/nc: **2%**

25 a 34: N=1133

Por relaciones sexuales: **93%**  
Por contacto con sangre: **79%**  
Por compartir equipo de inyección: **26%**  
Por uso de drogas: **10%**  
De madre a hijo: **9%**  
Otra: **3%**  
Ns/nc: **2%**

35 a 44: N=765

Por relaciones sexuales: **93%**  
Por contacto con sangre: **74%**  
Por compartir equipo de inyección: **27%**  
Por uso de drogas: **12%**  
De madre a hijo: **8%**  
Otra: **4%**  
Ns/nc: **2%**

45 a 54: N= 543

Por relaciones sexuales: **92%**  
Por contacto con sangre: **68%**  
Por compartir equipo de inyección: **26%**  
Por uso de drogas: **11%**  
De madre a hijo: **7%**  
Otra: **6%**  
Ns/nc: **2%**

55 a 69: N=332

Por relaciones sexuales: **87%**  
Por contacto con sangre: **57%**  
Por compartir equipo de inyección: **24%**  
Por uso de drogas: **11%**  
De madre a hijo: **8%**  
Otra: **6%**  
Ns/nc: **7%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=226

Por relaciones sexuales: **78%**  
Por contacto con sangre: **40%**  
Por compartir equipo de inyección: **11%**  
Por uso de drogas: **4%**  
De madre a hijo: **2%**  
Otra: **5%**  
Ns/nc: **17%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=1644

Por relaciones sexuales: **91%**  
Por contacto con sangre: **64%**  
Por compartir equipo de inyección: **22%**  
Por uso de drogas: **10%**  
De madre a hijo: **4%**  
Otra: **5%**  
Ns/nc: **4%**

Secundaria completa: N=883

Por relaciones sexuales: **95%**  
Por contacto con sangre: **75%**  
Por compartir equipo de inyección: **30%**  
Por uso de drogas: **12%**  
De madre a hijo: **8%**  
Otra: **3%**  
Ns/nc: **1%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=699

Por relaciones sexuales: **94%**  
Por contacto con sangre: **86%**  
Por compartir equipo de inyección: **32%**  
Por uso de drogas: **11%**  
De madre a hijo: **11%**  
Otra: **4%**  
Ns/nc: **0%**

Terciaria completa / Universitaria completa: N=548

Por relaciones sexuales: **94%**  
Por contacto con sangre: **84%**  
Por compartir equipo de inyección: **31%**  
Por uso de drogas: **12%**  
De madre a hijo: **15%**  
Otra: **3%**  
Ns/nc: **0%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: N=2038

Por relaciones sexuales: **90%**

Por contacto con sangre: **65%**

Por compartir equipo de inyección: **24%**

Por uso de drogas: **9%**

De madre a hijo: **5%**

Otra: **5%**

Ns/nc: **5%**

Nivel medio: N=1377

Por relaciones sexuales: **94%**

Por contacto con sangre: **77%**

Por compartir equipo de inyección: **28%**

Por uso de drogas: **12%**

De madre a hijo: **10%**

Otra: **3%**

Ns/nc: **1%**

Nivel alto: N=585

Por relaciones sexuales: **93%**

Por contacto con sangre: **82%**

Por compartir equipo de inyección: **29%**

Por uso de drogas: **13%**

De madre a hijo: **11%**

Otra: **4%**

Ns/nc: **1%**

## **Conocimiento de los modos de protegerse de la transmisión del VIH**

### **Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)**

**2004.** de Salta, Ciudad de Mendoza, Ciudad de Córdoba, Rosario, Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. (Maulen, 2008) N= 1000.

*“¿De qué modo pueden protegerse las personas de la transmisión del VIH?”*

Utilizando preservativo

En sexo anal

Se reduce el riesgo: **76.7%**

No se modifica el riesgo: **6.5%**

Sexo oral reduce el riesgo en el no se modifica

Se reduce el riesgo: **62.3%.**

No se modifica el riesgo: **9.9%.**

**2007** Bariloche Mar del Plata, Córdoba, Rosario y AMBA. (Barrón, 2008) N= 307

*“¿De qué modo pueden protegerse las personas de la transmisión del VIH?”*

Usando preservativo: **96%**



Evitar inyecciones con agujas contaminadas: **29%**  
No tener relaciones sexuales: **14%**  
Que los miembros de la pareja no tengan otras parejas: **11%**  
No tener sexo con cualquier persona: **10%**  
Información: **9%**  
    Evitar las transfusiones de sangre: **8%**  
    Tener menos parejas sexuales: **7%**  
    Controles (test): **5%**  
    Precaución/cuidado: **5%**  
    Otros: **3%**

## *Usuarios de drogas*

**2007.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2008) N= 355

Usar preservativo: **88.8%**  
Disminuir el nº de parejas: **16.8%**  
No compartir equipo inyección: **18.5%**  
Limpiar equipo de inyección comp: **4.3%**  
No consumir por vía endovenosa: **16.8%**

Por participación en el programa de reducción de daños

Participa N= 59

Usar preservativo: **88.1%**  
No compartir equipo inyección: **25.4%**

No participa N= 166

Usar preservativo: **88.6%**  
No compartir equipo inyección: **16.3%**

Por sexo:

Masculino N= 193

Usar preservativo: **88.1%**  
Disminuir el nº de parejas: **18.1%**  
No compartir equipo inyección: **18.1%**  
Limpiar equipo de inyección comp.: **3.6%**  
No consumir por vía endovenosa **16.6%**

Femenino N= 39

Usar preservativo: **92.3%**  
Disminuir el nº de parejas: **10.3%**  
No compartir equipo inyección: **20.5%**  
Limpiar equipo de inyección comp.: **7.7%**  
No consumir por vía endovenosa: **17.9%**

Por grupo de edad

Hasta 24 años. N= 108

Usar preservativo: **88.9%**  
Disminuir el nº de parejas: **13.9%**  
No compartir equipo inyección: **12%**  
Limpiar equipo de inyección comp.: **2.8%**  
No consumir por vía endovenosa: **19.1%**

25-34 años: N= 83

Usar preservativo: **89.2%**

Disminuir el nº de parejas: **18.1%**

No compartir equipo inyección: **19.3%**

Limpiar equipo de inyección comp: **2.4%**

No consumir por vía endovenosa: **13.3%**

35 años y más N= 41

Usar preservativo: **87.8%**

Disminuir el nº de parejas: **22%**

No compartir equipo inyección: **34.1%**

Limpiar equipo de inyección comp.: **12.2%**

No consumir por vía endovenosa: **17.1%**

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta N= 19

Usar preservativo: **89.5%**

Disminuir el nº de parejas: **15.8%**

No compartir equipo inyección: **21.1%**

Limpiar equipo de inyección comp.: **0%**

No consumir por vía endovenosa: **15.8%**

Primaria completa-secundaria incompleta N= 153

Usar preservativo: **89.5%**

Disminuir el nº de parejas: **18.3%**

No compartir equipo inyección: **10.3%**

Limpiar equipo de inyección comp.: **6.5%**

No consumir por vía endovenosa: **18.3%**

Secundaria completa y más. N= 60

Usar preservativo: **86.7%**

Disminuir el nº de parejas: **13.3%**

No compartir equipo inyección: **18.3%**

Limpiar equipo de inyección comp: **0%**

No consumir por vía endovenosa: **13.3%**

## *Trabajadores/as Sexuales*

**2007.** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad de Córdoba, Paraná, Rosario y ciudad de Mendoza. (Comas, 2008) N= 415

Uso de preservativo: **95,7%**

Evitar inyecciones con agujas infectadas/usadas: **12,3%.**

## *Población general*

**2008.** Nacional (Jorrat, 2008)

Total: N=3281

Cuidándose de las relaciones sexuales: **97%**

Cuidándose en el contacto con sangre: **17%**

No compartir equipo de inyección, drogas: **27%**

Informándose, yendo a control médico: **5%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.3%**

Por Sexo:

Hombres: N=1903

Cuidándose de las relaciones sexuales: **96%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **15%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **25%**  
Informándose, yendo a control médico: **5%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.4%**

Mujeres: N= 1918

Cuidándose de las relaciones sexuales: **98%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **18%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **30%**  
Informándose, yendo a control médico: **5%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.4%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N= 468

Cuidándose de las relaciones sexuales: **98%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **12%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **25%**  
Informándose, yendo a control médico: **3%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.4%**

20 a 24: N=712

Cuidándose de las relaciones sexuales: **98%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **16%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **26%**  
Informándose, yendo a control médico: **4%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.3%**

25 a 34: N= 1083

Cuidándose de las relaciones sexuales: **97%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **21%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **31%**  
Informándose, yendo a control médico: **6%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.4%**

35 a 44: N= 739

Cuidándose de las relaciones sexuales: **97%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **18%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **31%**  
Informándose, yendo a control médico: **4%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.1%**

45 a 54: N= 522

Cuidándose de las relaciones sexuales: **97%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **15%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **23%**  
Informándose, yendo a control médico: **8%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.6%**

55 a 69: N=297

Cuidándose de las relaciones sexuales: **94%**

Cuidándose en el contacto con sangre: **12%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **22%**  
Informándose, yendo a control médico: **4%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.3%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=187

Cuidándose de las relaciones sexuales: **96%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **7%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **12%**  
Informándose, yendo a control médico: **3%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.5%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=1543

Cuidándose de las relaciones sexuales: **97%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **13%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **22%**  
Informándose, yendo a control médico: **3%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.3%**

Secundaria completa: N=859

Cuidándose de las relaciones sexuales: **97%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **16%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **30%**  
Informándose, yendo a control médico: **5%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.3%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=690

Cuidándose de las relaciones sexuales: **98%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **23%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **32%**  
Informándose, yendo a control médico: **7%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.3%**

Terciaria completa / universitaria completa: N=542

Cuidándose de las relaciones sexuales: **98%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **25%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **40%**  
Informándose, yendo a control médico: **7%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.6%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: N=1898

Cuidándose de las relaciones sexuales: **97%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **15%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **23%**  
Informándose, yendo a control médico: **3%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.4%**

Nivel medio: N=1345

Cuidándose de las relaciones sexuales: **98%**  
Cuidándose en el contacto con sangre: **17%**  
No compartir equipo de inyección, drogas: **31%**  
Informándose, yendo a control médico: **6%**  
Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.1%**

Nivel alto: N=578

Cuidándose de las relaciones sexuales: **97%**

Cuidándose en el contacto con sangre: **22%**

No compartir equipo de inyección, drogas: **32%**

Informándose, yendo a control médico: **6%**

Mantenerse lejos de las personas con VIH/sida: **0.5%**

## ***Información acerca del grado en que varía el riesgo de infección del VIH/sida***

### ***Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)***

**2004.** Ciudad de Salta, Ciudad de Mendoza, Ciudad de Córdoba, Rosario, Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. (Maulen, 2008) N= 1000.

¿En qué grado varía el riesgo de infección de VIH/sida si se usa preservativo para sexo anal?

Se reduce: **77%**

¿En qué grado varía el riesgo de infección de VIH/sida si se usa preservativo para sexo oral?

Se reduce: **77%**

¿En qué grado varía el riesgo de infección de VIH/sida si se está en pareja monogámica (fidelidad)?

Se reduce: **37%**

¿En qué grado varía el riesgo de infección de VIH/sida si se evita la eyaculación en la boca (recibirla)?

Se reduce: **37%**

¿En qué grado varía el riesgo de infección de VIH/sida si se evita el sexo anal?

Se reduce: **35%**

¿En qué grado varía el riesgo de infección de VIH/sida si se practica el coitus interruptus?

Se reduce: **33%**

**2007.** Bariloche Mar del Plata, Córdoba, Rosario y AMBA. (Barrón, 2008) N= 307

¿En qué grado varía el riesgo de infección de VIH/sida si se usa preservativo para sexo anal?

Se reduce: **76%**

Desaparece: **18%**

No se modifica: **5%**

¿En qué grado varía el riesgo de infección de VIH/sida si se usa preservativo para sexo oral?

Se reduce: **66%**

Desaparece: **23%**

No se modifica: **7%**

¿En qué grado varía el riesgo de infección de VIH/sida si se está en pareja monogámica (fidelidad)?

Se reduce: **42%**

Desaparece: **13%**

No se modifica: **31%**

¿En qué grado varía el riesgo de infección de VIH/sida si se evita la eyaculación en la boca (recibirla)?

Se reduce: **37%**

Desaparece: **7%**

No se modifica: **48%**

¿En qué grado varía el riesgo de infección de VIH/sida si se evita el sexo anal?

Se reduce: **28%**

Desaparece: **9%**

No se modifica: **51%**

¿En qué grado varía el riesgo de infección de VIH/sida si se practica el coitus interruptus?

Se reduce: **24%**

Desaparece: **7%**

No se modifica: **54%**

**2007.** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad de Córdoba, Paraná, Rosario y ciudad de Mendoza. (Comas, 2008) N= 415

Percepción de riesgo de contraer VIH.

Muchas posibilidades: **35.3%**

Alguna posibilidad: **45.6%**

Ninguna posibilidad: **17.4%**

## **Grado de información sobre VIH/sida**

### ***Población general***

**2008.** Nacional (Jorrat, 2008)

Total: N= 4000

Ninguna información: **33%**

Poca información: **28%**

Alta información: **39%**

Por sexo:

Masculino:

Ninguna información: **39%**

Poca información: **29%**

Alta información: **32%**

Femenino: N= 2005

Ninguna información: **27%**

Poca información: **27%**

Alta información: **46%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=492

Ninguna información: **43%**

Poca información: **28%**

Alta información: **29%**

20 a 24: N= 745

Ninguna información: **37%**

Poca información: **30%**

Alta información: **33%**

25 a 34: N=1123

Ninguna información: **27%**

Poca información: **27%**

Alta información: **46%**

35 a 44: N= 765

Ninguna información: **30%**

Poca información: **29%**

Alta información: **41%**

45 a 54: N=543

Ninguna información: **29%**

Poca información: **29%**

Alta información: **42%**

55 a 69: N= 332

Ninguna información: **43%**

Poca información: **25%**

Alta información: **32%**

Según nivel de instrucción:

Total: N=4000

Ninguna información: **33%**

Poca información: **28%**

Alta información: **39%**

Primaria incompleta: N=226

Ninguna información: **62%**

Poca información: **24%**

Alta información: **14%**

Primaria incompleta, Secundaria incompleta: N=1644

Ninguna información: **42%**

Poca información: **29%**

Alta información: **29%**

Secundaria completa: N=883

Ninguna información: **30%**  
Poca información: **29%**  
Alta información: **41%**  
Terciaria incompleta, Universitaria incompleta: N=699  
Ninguna información **21%**  
Poca información: **29%**  
Alta información: **50%**  
Terciaria completa, Universitaria completa: N= 548  
Ninguna información: **16%**  
Poca información: **25%**  
Alta información: **59%**

Por nivel de ingreso familiar:  
Ingreso bajo: N=2038  
Ninguna información **38%**  
Poca información: **30%**  
Alta información: **32%**  
Ingreso medio: N=1377  
Ninguna información: **28%**  
Poca información: **27%**  
Alta información: **45%**  
Ingreso Alto: N= 585  
Ninguna información: **27%**  
Poca información: **28%**  
Alta información: **45%**

## **Informacion sobre ITS - Que ITS conoce?**

### **Usuarios de drogas**

Si han escuchado hablar de ITS

**2007.** Mendoza, Rosario, Neuquén, AMBA (Mendes, 2007)  
Si **86.8%** N=355

Por Participación en programa de reducción de daños:  
Participa en PRD: **91.6%** N=83  
No participa en PRD: **85.1%** N=255  
No sabe no contesta: **88.2%** N=17

Por Sexo:  
Masculino: **86.1%** N=287  
Femenino: **89.7%** N=68

Por edad:  
Hasta 24 años: **82.4%** N= 153  
25-34 años: **91.4%** N= 129



35 años y más: **87.7%** N= 73

Por nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta: **75.7%** N= 37

Primaria completa-secundaria incompleta: **86.1%** N= 244

Secundaria completa y más: **94.6%** N= 74

No **10.4%** N=355

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **7.2%** N=83

No participa en PRD: **11.8%** N=255

No sabe no contesta: **5.8%** N=17

Por Sexo

Masculino: **11.1%** N=287

Femenino: **7.4%** N=68

Por edad

Hasta 24 años: **15.7 %** N= 153

25-34 años: **3.9 %** N= 129

35 años y más: **11%** N= 73

Por nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta: **24.3%** N= 37

Primaria completa-secundaria incompleta: **11.1%** N= 244

Secundaria completa y más: **1.4%** N= 74

No sabe no contesta **2.8%** N=355

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **1.2%** N=15

No participa en PRD: **3.1%** N=61

No sabe no contesta: **5.9%** N=3

Por Sexo

Masculino: **2.8%** N=67

Femenino: **2.9%** N=12

Por edad

Hasta 24 años: **2%** N= 29

25-34 años: **4.7 %** N= 29

35 años y más: **1.4%** N= 21

Por nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta: **0 %** N= 6

Primaria completa-secundaria incompleta: **2.9 %** N= 58

Secundaria completa y más: **4.1%** N= 15

## *Trabajadores/as Sexuales*

**2007.** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad de Córdoba, Paraná, Rosario y ciudad de Mendoza. (Comas 2008) N= 415

Conoce alguna/s ITS: **92%**

ITS mencionadas

Clamidia **2,7%**

Condiloma, Papiloma o HPV: **7.2%**

Herpes genital: **13.5%**

Hepatitis B: **14.5%**

Hongos: **21%**

Gonorrea: **24.8%**

Sífilis: **69.6%**

VIH/sida: **77.3%**

## **Grado de información sobre síntomas de ITS**

### *Población General*

**2008.** Nacional (Jorrat, 2008)

Total: N=4000

Ninguna información: **54%**

Poca información: **13%**

Alta información: **33%**

Por sexo:

Masculino: N=1995

Ninguna información: **56%**

Poca información: **15%**

Alta información: **29%**

Femenino: N=2005

Ninguna información: **52%**

Poca información: **10%**

Alta información: **38%**

Por Grupo de edad

15 a 19: N=492

Ninguna información: **72%**

poca información: **11%**

alta información: **17%**

20 a 24 : N=745

Ninguna información: **59%**

poca información: **11%**

alta información: **30%**

25 a 34 : N=1123

Ninguna información: **50%**  
Poca información: **12%**  
Alta información: **38%**  
35 a 44 años: N=765  
Ninguna información: **47%**  
Poca información: **16%**  
Alta información: **37%**  
45 a 54 años: N=543  
Ninguna información: **47%**  
Poca información: **14%**  
Alta información: **39%**  
55 a 69 años: N=332  
Ninguna información: **56%**  
Poca información: **11%**  
Alta información: **33%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=226  
Ninguna información: **76%**  
Poca información: **13%**  
Alta información: **11%**  
Primaria completa / Secundaria incompleta: N=1644  
Ninguna información: **63%**  
Poca información: **13%**  
Alta información: **24%**  
Secundaria completa: N= 883  
Ninguna información: **52%**  
Poca información: **14%**  
Alta información: **34%**  
Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=699  
Ninguna información: **44%**  
Poca información: **11%**  
Alta información: **45%**  
Terciaria completa / Secundaria completa: N=548  
Ninguna información: **34%**  
Poca información: **10%**  
Alta información: **56%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: N=2038  
Ninguna información: **59%**  
Poca información: **13%**  
Alta información: **28%**  
Nivel medio: N=1377  
Ninguna información: **50%**  
Poca información: **12%**  
Alta información: **38%**  
Nivel alto: N=585  
Ninguna información: **46%**  
Poca información: **12%**

Alta información: **42%**

## *Usuarios de drogas*

**2007.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2008) N= 355

Bajo: **7.3%**; Medio: **27.9%**; Alto: **64.8%**

Por participación en el programa de reducción de daños

Participa N= 83

Bajo: **6%**; Medio: **20.5%**; Alto: **73.5%**

No participa N= 255

Bajo: **7.8%**; Medio: **31.8%**; Alto: **60.4%**

Por sexo:

Masculino: N= 287

Bajo: **8%**; Medio: **27.9%**; Alto: **64.1%**

Femenino N= 68

Bajo: **4.4%**; Medio: **27.9%**; Alto: **67.6%**

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: N= 153

Bajo: **10.5%**; Medio: **38.6%**; Alto: **51%**

25-34 años: N= 129

Bajo: **7%**; Medio: **21.7%**; Alto: **82.2%**

35 años y más N= 73

Bajo: **1.4%**; Medio: **16.4%**; Alto: **82.2%**

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta N= 37

Bajo: **21.6%**; Medio: **24.3%**; Alto: **54.1%**

Primaria completa-secundaria incompleta N= 244

Bajo: **6.6%**; Medio: **29.9%**; Alto: **63.5%**

Secundaria completa y más. N= 74

Bajo: **2.7%**; Medio: **23%**; Alto: **74.3%**

## ***Medidas que puede tomar una mujer si sabe que su pareja tiene una ITS, según sexo y edad***

### *Población general*

2008. Nacional. (Jorrat, 2008)

Total: N= 4000

Negarse a tener relaciones **26%**

Proponer el uso de preservativo: **38%**

Consulta médica: **35%**

Separarse: **3%**

Otra: **5%**

Por sexo:

Masculino: N=1995

Negarse a tener relaciones: **27%**

Proponer el uso de preservativo: **36%**

Consulta médica: **29%**

Separarse: **3%**

Otra: **4%**

Femenino: N= 2005

Negarse a tener relaciones: **25%**

Proponer el uso de preservativo: **40%**

Consulta médica: **40%**

Separarse: **3%**

Otra: **5%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N= 492

Negarse a tener relaciones: **21%**

Proponer el uso de preservativo: **41%**

Consulta médica: **23%**

Separarse: **1%**

Otra: **4%**

20 a 24: N= 745

Negarse a tener relaciones: **25%**

Proponer el uso de preservativo: **42%**

Consulta médica: **32%**

Separarse: **3%**

Otra: **5%**

25 a 34: N=1123

Negarse a tener relaciones: **27%**

Proponer el uso de preservativo: **38%**

Consulta médica: **37%**

Separarse: **2%**

Otra: **5%**

35 a 44: N= 765

Negarse a tener relaciones: **26%**

Proponer el uso de preservativo: **39%**

Consulta médica: **37%**

Separarse: **3%**

Otra: **4%**

45 a 54: N= 543

Negarse a tener relaciones: **27%**

Proponer el uso de preservativo: **33%**

Consulta médica: **41%**

Separarse: **3%**

Otra: **4%**

55 a 69: N= 332

Negarse a tener relaciones: **33%**

Proponer el uso de preservativo: **29%**

Consulta médica: **37%**  
Separarse: **4%**  
Otra: **2%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N= 226

Negarse a tener relaciones: **26%**  
Proponer el uso de preservativo: **24%**  
Consulta médica: **34%**  
Separarse: **4%**  
Otra: **1%**

Primaria completa / Secundaria incompleta: N=1644

Negarse a tener relaciones: **27%**  
Proponer el uso de preservativo: **35%**  
Consulta médica: **29%**  
Separarse: **3%**  
Otra: **0%**

Secundaria completa: N=883

Negarse a tener relaciones: **27%**  
Proponer el uso de preservativo: **38%**  
Consulta médica: **36%**  
Separarse: **2%**  
Otra: **0%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=699

Negarse a tener relaciones: **24%**  
Proponer el uso de preservativo: **44%**  
Consulta médica: **40%**  
Separarse: **1%**  
Otra: **1%**

Terciaria completa / universitaria completa: N=548

Negarse a tener relaciones: **26%**  
Proponer el uso de preservativo: **44%**  
Consulta médica: **44%**  
Separarse: **3%**  
Otra: **1%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: N=2038

Negarse a tener relaciones: **23%**  
Proponer el uso de preservativo: **43%**  
Consulta médica: **44%**  
Separarse: **3%**  
Otra: **4%**

Nivel medio: N=1377

Negarse a tener relaciones: **33%**  
Proponer el uso de preservativo: **45%**  
Consulta médica: **38%**  
Separarse: **2%**  
Otra: **4%**

Nivel alto: N=585

Negarse a tener relaciones: **22%**  
Proponer el uso de preservativo: **43%**  
Consulta médica: **49%**  
Separarse: **0%**  
Otra: **0%**

## ***Fuentes de información sobre VIH***

### ***Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)***

**2007.** Bariloche Mar del Plata, Córdoba, Rosario y AMBA. (Barrón López, Sara. 2008) N= 307.

Fuente de información:

Televisión: **46%**  
Servicio de salud: **29%**  
Amigos: **24%**  
Revistas: **24%**  
Radio: **19%**,  
Organizaciones no gubernamentales: **16%**  
Compañero/a de estudio/trabajo: **11%**  
Internet: **7%**  
Familiar: **5%**  
Pareja: **5%**  
Folletos: **3%**

## ***Percepciones en relación con las personas que viven con VIH/sida***

**2004.** Salta, Mendoza, Córdoba, Rosario, Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. (Maulen, 2004)

¿Compartiría una comida con una persona que sabe o sospecha que vive con VIH/sida?

Si: **99%**

¿Aceptaría trabajar y/o estudiar con una persona que vive con VIH/sida?

Si: **98%**

¿Tomaría del mismo vaso que una persona que sabe o sospecha que vive con VIH/sida?

Si: **96%**

Si un miembro de su familia contrae VIH/sida, ¿aceptaría cuidarlo en su casa?

Si: **94%**

Si un maestro vive con VIH, ¿piensa que se le debería permitir seguir enseñando en la escuela?

Si: **94%**

Si se enterara de que alguien que vende frutas y verduras vive con VIH, ¿le seguiría comprando?

Si: **93%**

- ¿Conoce a alguien que viva con VIH o haya muerto de sida?  
Si: **81%**
- ¿Tendría o continuaría teniendo sexo con una persona que no conoce su estatus serológico?  
Si: **69%**
- Si su pareja sexual viviera con VIH/sida, ¿cree que debería ser informado/a, aún sin el consentimiento de él/ella?  
Si: **66%**
- ¿Tendría sexo con una persona que le dice que es seropositiva?  
Si: **59%**
- Si un miembro de su familia contrae VIH/sida, ¿querría que lo mantuviera en secreto?  
Si: **34%**

## **¿Existe algún tratamiento para el VIH/sida?**

### *Hombres que tienen sexo con hombres*

**2007.** Bariloche, Mar del Plata, Cordoba, Rosario y AMBA (Barron, 2008)  
N=307

- Si: **95%**; No: **4%** No sabe no contesta: **1%**  
Con ese tratamiento, ¿se logra la cura?  
Si: **7%**; No: **91%** No sabe no contesta: **2%**

## **Percepciones en relación con las personas que viven con VIH/sida**

### *Hombres que tienen sexo con hombres*

**2007.** Bariloche, Mar del Plata, Cordoba, Rosario y AMBA (Barron, 2008)  
N=307

- ¿Compartiría una comida con una persona que sabe o sospecha que vive con VIH/sida?  
Si: **97%**
- ¿Aceptaría trabajar y/o estudiar con una persona que vive con VIH/sida?  
Si: **98%**
- ¿Tomaría del mismo vaso que una persona que sabe o sospecha que vive con VIH/sida?  
Si: **92%**
- Si un miembro de su familia contrae VIH/sida, ¿acceptaría cuidarlo en su casa?  
Si: **97%**



Si un maestro vive con VIH, ¿piensa que se le debería permitir seguir enseñando en la escuela?

Si: **97%**

Si se enterara de que alguien que vende frutas y verduras vive con VIH, ¿le seguiría comprando?

Si: **91%**

¿Tendría o continuaría teniendo sexo con una persona que no conoce su estatus serológico?

Si: **74%**

Si su pareja sexual viviera con VIH/sida, ¿cree que debería ser informado/a, aún sin el consentimiento de él/ella?

Si: **75%**

¿Tendría sexo con una persona que le dice que es seropositiva?

Si: **54%**

Si un miembro de su familia contrae VIH/sida, ¿querría que lo mantuviera en secreto?

Si: **39%**

## ***Mujeres que recibieron información o consejos sobre el VIH en el momento de los controles***

### ***Mujeres embarazadas***

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008)

Total: N=828

Si: **49%**; No: **51%**; Ns/nc: **0%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=29

Si: **55%**; No: **45%**; Ns/nc: **1%**

20 a 24: N=151

Si: **55%**; No: **45%**; Ns/nc: **0%**

25 a 34: N=410

Si: **50%**; No: **49%**; Ns/Nc: **1%**

35 a 44: N=197

Si: **44%**; No: **56%**; Ns/nc: **0%**

45 a 54: N=41

Si: **42%**; No: **56%**; Ns/nc: **0%**

55 a 69: N=0%)

Si: **0%**; No: **0%**; Ns/nc: **0%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=43

Si: **44%**; No: **54%**; Ns/nc: **2%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=339

Si: **51%**; No: **48%**; Ns/nc: **1%**

Secundaria completa: N=184

Si: **50%**; No: **49%**; Ns/nc: **1%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N= 116

Si: **47%**; No: **52%**; Ns/nc: **1%**

Terciaria completa / universitaria completa: N=146

Si: **47%**; No: **53%**; Ns/nc: **0%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: N=476

Si: **48%**; No: **51%**; Ns/nc: **1%**

Nivel medio: N=262

Si: **53%**; No: **47%**; Ns/nc: **0%**

Nivel alto: N=90

Si: **45%**; No: **54%**; Ns/nc: **1%**

## Comportamiento

### *Distribución de la población encuestada según auto nominación sexual*

#### *Personas con VIH*

**2006.** Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008) N=818

Por sexo:

Varones: N=521

Heterosexual **63.9%**

Bisexual: **9.2%**

Gay: **11.5%**

Homosexual: **13.1%**

No quiere definirse/nc: **2.3%**

Mujeres: N=297

Heterosexual: **96%**

Bisexual: **1%**

Lesbiana: **1%**

No quiere definirse/nc: **2%**

Por regiones geográficas:

AMBA:

Varones: N=309

Heterosexual: **68.9%**

Bisexual: **7.1%**

Gay: **10.4%**

Homosexual: **12.3%**

No quiere definirse/nc: **1.3%**

Mujeres: N=165

Heterosexual: **98.2%**

Bisexual: **0.6%**

Lesbiana: **0.6%**

No quiere definirse/nc: **0.6%**

Pampeana:

Varones: N=97

Heterosexual: **57.7%**

Bisexual: **10.3%**

Gay: **14.4%**

Homosexual: **14.4%**

No quiere definirse/nc: **3.1%**

Mujeres: N=165

Heterosexual: **89.0%**  
Bisexual: **2.7%**  
Lesbiana: **2.7%**  
No quiere definirse/nc: **5.5%**

Patagonia:

Varones: N=37

Heterosexual: **64.9%**  
Bisexual: **5.4%**  
Gay: **10.8%**  
Homosexual: **18.9%**  
No quiere definirse/nc: **0.0%**

Mujeres: N=21

Heterosexual: **100.0%**  
Bisexual: **0.0%**  
Lesbiana: **0.0%**  
No quiere definirse/nc: **0.0%**

NOA:

Varones: N=38

Heterosexual: **55.3%**  
Bisexual: **21.1%**  
Gay: **7.9%**  
Homosexual: **2.6%**  
No quiere definirse/nc: **13.2%**

Mujeres: N=20

Heterosexual: **95.0%**  
Bisexual: **0.0%**  
Lesbiana: **0.0%**  
No quiere definirse/nc: **5.0%**

NEA:

Varones: N=40

Heterosexual: **47.5%**  
Bisexual: **15.0%**  
Gay: **17.5%**  
Homosexual: **20.0%**  
No quiere definirse/nc: **0.0%**

Mujeres: N=18

Heterosexual: **100.0%**  
Bisexual: **0.0%**  
Lesbiana: **0.0%**  
No quiere definirse/nc: **0.0%**

***Parejas sexuales: Tipo de pareja actual, según sexo y edad***

## *Población General*

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008)

Total: N= 4000.

Solo pareja estable: **67%**

Parejas ocasionales: **20%**

Sin pareja/ns- nc: **13%**

Por sexo:

Hombres: N=1995

Sólo pareja estable: **60%**

Parejas ocasionales: **32%**

Sin pareja/ns-nc: **8%**

Mujeres: N=2005

Sólo pareja estable: **74%**

Parejas ocasionales: **8%**

Sin pareja/ns-nc: **18%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N= 492

Sólo pareja estable: **33%**

Parejas ocasionales: **27%**

Sin pareja/ns-nc: **40%**

20 a 24: N=745

Sólo pareja estable: **56%**

Parejas ocasionales: **33%**

Sin pareja/ns-nc: **11%**

25 a 34: N= 1123

Sólo pareja estable: **76%**

Parejas ocasionales: **19%**

Sin pareja/ns-nc: **5%**

35 a 44: N=765

Sólo pareja estable: **79%**

Parejas ocasionales: **14%**

Sin pareja/ns-nc: **7%**

45 a 54: N=543

Sólo pareja estable: **77%**

Parejas ocasionales: **12%**

Sin pareja/ns-nc: **11%**

55 a 69: N=332

Sólo pareja estable: **71%**

Parejas ocasionales: **8%**

Sin pareja/ns-nc: **21%**

Según nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N= 226

Sólo pareja estable: **63%**

Parejas ocasionales: **20%**

Sin pareja/ns-nc: **17%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=1644

Sólo pareja estable: **63%**  
 Parejas ocasionales: **21%**  
 Sin pareja/ns-nc: **16%**  
 Secundaria Completa: N=883  
 Sólo pareja estable: **70%**  
 Parejas ocasionales: **21%**  
 Sin pareja/ns-nc: **9%**  
 Terciaria incompleta / Universitaria incompleta: N=699  
 Sólo pareja estable: **64%**  
 Parejas ocasionales: **23%**  
 Sin pareja/ns-nc: **13%**  
 Terciaria Completa / universitaria completa: N=548  
 Sólo pareja estable: **79%**  
 Parejas ocasionales: **12%**  
 Sin pareja/ns-nc: **9%**

Por nivel de ingreso familiar:  
 Ingreso Bajo: N=2038  
 Sólo pareja estable: **63%**  
 Parejas ocasionales: **21%**  
 Sin pareja/ns-nc: **16%**  
 Ingreso medio: N=1377  
 Sólo pareja estable: **71%**  
 Parejas ocasionales: **18%**  
 Sin pareja/ns-nc: **11%**  
 Ingreso alto: N=585  
 Sólo pareja estable: **72%**  
 Parejas ocasionales: **21%**  
 Sin pareja/ns-nc: **7%**

## ***Tipo de Parejas sexuales en el último año***

### ***Población General***

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008)

Total: N=3446

Pareja Estable:

Si: **90%** No: **10%**

Parejas ocasionales:

Si: **23%** No: **77%**

Según sexo:

Masculino: N=1820

Pareja estable:

Si: **85%** No: **15%**

Parejas ocasionales:

Si: **34%** No: **66%**

Femenino: N=1626

Pareja estable:

Si: **96%** No: **4%**

Parejas ocasionales:  
Si: **10%** No: **90%**

Según nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=189

Pareja estable:  
Si: **89%** No: **11%**

Parejas ocasionales:  
Si: **24%** No: **76%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=1368

Pareja estable:  
Si: **89%** No: **11%**

Parejas ocasionales:  
Si: **24%** No: **76%**

Secundaria completa: N=797

Pareja estable:  
Si: **91%** No: **9%**

Parejas ocasionales:  
Si: **23%** No: **77%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=609

Pareja estable:  
Si: **88%** No: **12%**

Parejas ocasionales:  
Si: **26%** No: **74%**

Terciaria completa / Universitaria completa: N= 492

Pareja estable:  
Si: **95%** No: **5%**

Parejas ocasionales:  
Si: **12%** No: **88%**

Por nivel de ingreso familiar:

Ingreso Bajo: N=1684

Pareja estable:  
Si: **89%** No: **11%**

Parejas ocasionales:  
Si: **25%** No: **75%**

Ingreso medio: N=1220

Pareja estable:  
Si: **91%** No: **9%**

Parejas ocasionales:  
Si: **20%** No: **80%**

Ingreso alto: N=542

Pareja estable:  
Si: **91%** No: **9%**

Parejas ocasionales:  
Si: **23%** No: **77%**

## **Cantidad de parejas sexuales en los últimos cinco años**

### **Población General**

**2008** (Jorrat, 2008)

Nacional: N=3446

Una: **58%** Dos: **12%** Tres o más: **27%** Ns-nc: **3%**

Por sexo:

Masculino: N= 1821

Una: **47%** Dos: **9%** Tres o más: **39%** Ns-nc: **5%**

Femenino: N= 1625

Una: **71%** Dos: **15%** Tres o más: **14%** Ns-nc: **0%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N= 297

Una: **39%** Dos: **19%** Tres o más: **38%** Ns-nc: **4%**

20 a 24: N=668

Una: **33%** Dos: **14%** Tres o más: **46%** Ns-nc: **7%**

25 a 34: N=1061

Una: **56%** Dos: **14%** Tres o más: **27%** Ns-nc: **3%**

35 a 44: N=715

Una: **72%** Dos: **9%** Tres o más: **17%** Ns-nc: **2%**

45 a 54: N=471

Una: **78%** Dos: **7%** Tres o más: **12%** Ns-nc: **3%**

55 a 69: N=234

Una: **81%** Dos: **4%** Tres o más: **13%** Ns-nc: **2%**

Según nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N= 3446

Una: **50%** Dos: **9%** Tres o mas: **28%** Ns-nc: **3%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=1371

Una: **59%** Dos: **12%** Tres o mas: **26%** Ns-nc: **3%**

Secundaria completa: N= 795

Una: **58%** Dos: **11%** Tres o mas: **27%** Ns-nc: **4%**

Terciaria incompleta / Universidad incompleta: N=614

Una: **50%** Dos: **14%** Tres o mas: **33%** Ns-nc: **3%**

Terciaria completa / universitaria completa: N=488

Una: **66%** Dos: **13%** Tres o mas: **18%** Ns-nc: **3%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: N=1690

Una: **57%** Dos: **13%** Tres o más: **27%** Ns-nc: **3%**

Nivel medio: N=1212

Una: **61%** Dos: **11%** Tres o más: **25%** Ns-nc: **3%**

Nivel alto: N=544

Una: **56%** Dos: **11%** Tres o mas: **30%** Ns-nc: **3%**



## **Cantidad de parejas sexuales diferentes mantenidas en el último año**

### **Usuario de drogas**

(2007) Rosario, Mendoza, Neuquen, AMBA. (Mendes, 2007).N=331

Numero de parejas 0: **5.6%** N 331

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **9.9%** N=81

No participa en PRD: **4.3%** N=233

No sabe no contesta: **5.9%** N=17

Por Sexo:

Masculino: **6.7%** N=267

Femenino: **1.6%** N=64

Por edad:

Hasta 24 años: **4.3%** N= 140

25-34 años: **5.8%** N= 121

35 años y más: **8.6%** N= 70

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **16.1%** N= 31

Primaria completa-secundaria incompleta: **5.3%** N= 227

Secundaria completa y más: **2.7%** N= 73

Numero de parejas 1: **36.6%** N: 331

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **30.6 %** N=81

No participa en PRD: **36.9 %** N=233

No sabe no contesta: **58.8%** N=17

Por Sexo:

Masculino: **31.8 %** N=267

Femenino: **56.3%** N=64

Por edad:

Hasta 24 años: **25.7 %** N= 140

25-34 años: **49.6 %** N= 121

35 años y más: **35.7 %** N= 70

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **22.6 %** N= 31

Primaria completa-secundaria incompleta: **37 %** N= 227

Secundaria completa y más: **41.1%** N= 73

Numero de parejas 2: **9.4%** N: 331

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **7.4 %** N=81

No participa en PRD: **10.3 %** N=233

No sabe no contesta: **5.9 %** N=17

Por Sexo:

Masculino: **10.1 %** N=267

Femenino: **6.3%** N=64

Por edad:

Hasta 24 años: **12.1 %** N= 140

25-34 años: **5.8 %** N= 121

35 años y más: **10 %** N= 70

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **16.1 %** N= 31

Primaria completa-secundaria incompleta: **9.3 %** N= 227

Secundaria completa y más: **6.8 %** N= 73

Numero de parejas 3: **11.2%** N: 331

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **13.6 %** N=81

No participa en PRD: **10.7 %** N=233

No sabe no contesta: **5.9 %** N=17

Por Sexo:

Masculino: **10.9 %** N=267

Femenino: **12.5%** N=64

Por edad:

Hasta 24 años: **12.9 %** N= 140

25-34 años: **10.7 %** N= 121

35 años y más: **8.6 %** N= 70

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **3.2 %** N= 31

Primaria completa-secundaria incompleta: **11.9 %** N= 227

Secundaria completa y más: **12.3 %** N= 73

Numero de parejas 4 a10: **23.3%** N:331

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **25.9 %** N=81

No participa en PRD: **22.3%** N=233

No sabe no contesta: **23.5%** N=17

Por Sexo:

Masculino: **24.3 %** N=267  
Femenino: **18.8%** N=64

Por edad:

Hasta 24 años: **27.9 %** N= 140  
25-34 años: **19 %** N= 121  
35 años y más: **21.4 %** N= 70

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **25.8 %** N= 31  
Primaria completa-secundaria incompleta: **21.1 %** N= 227  
Secundaria completa y más.:**28.8 %** N= 73

Numero de parejas 11 y mas: **6.3%** N: 331

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **8.6 %** N=81  
No participa en PRD: **6 %** N=233  
No sabe no contesta: **0 %** N=17

Por Sexo:

Masculino: **7.5 %** N=267  
Femenino: **1.6%** N=64

Por edad:

Hasta 24 años: **6.4 %** N= 140  
25-34 años: **4.1 %** N= 121  
35 años y más: **10 %** N= 70

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **9.7 %** N= 31  
Primaria completa-secundaria incompleta: **7.5 %** N= 227  
Secundaria completa y más: **1.4 %** N= 73

No sabe no contesta: **7.6%** N: 331

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **3.7 %** N=81  
No participa en PRD: **9.4 %** N=233  
No sabe no contesta: **0 %** N=17

Por Sexo:

Masculino: **8.6 %** N=267  
Femenino: **3.1%** N=64

Por edad:

Hasta 24 años: **10.7 %** N= 140  
25-34 años: **5 %** N= 121  
35 años y más: **5.7 %** N= 70

Por nivel de instrucción.

Hasta primaria incompleta: **6.5 %** N= 31  
Primaria completa-secundaria incompleta: **7.9 %** N= 227  
Secundaria completa y más: **6.8 %** N= 73

## **Numero de parejas sexuales en los últimos 6 meses**

### *Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)*

**2007.** Bariloche Mar del Plata, Córdoba, Rosario y AMBA. (Barrón 2008)

N= 307. Varones= 219

0 pareja: **2.7%**  
1 pareja: **31.1%**  
2 a 5 parejas: **34.7%**  
6 a 10 parejas: **20.5%**  
11 a 50 parejas: **8.2%**  
51 a 200 parejas: **1.4%**  
Más de 200 parejas: **0.5%**  
No sabe / No contesta: **0.9%**

### *Población Trans*

**2007.** Bariloche Mar del Plata, Córdoba, Rosario y AMBA. (Barrón, 2008)

N= 88 personas.

0 pareja: **0%**  
1 pareja: **3.4%**  
2 a 5 parejas: **4.5%**  
6 a 10 parejas: **4.5%**  
11 a 50 parejas: **12.5%**  
51 a 200 parejas: **26.1%**  
Más de 200 parejas: **45.6%**  
No sabe / No contesta: **3.4%**

## **Numero de parejas en la última semana**

### *Hombres que tienen sexo con hombres*

**2001-2002.** Buenos Aires. (Pando, 2003)N= 694

0-1 pareja: **77.7%**  
2-5 parejas: **17.1%**  
Mas de 5 parejas: **5.2%**

**2004.** Salta, Ciudad de Mendoza, Ciudad de Córdoba, Rosario, Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. (Maulen,2004) N= 1000.

Total: N=939

Ninguno: **0.40%**  
1: **17.80%**  
2 a 5: **25.20%**  
6 a 10: **13.20%**  
11 a 50: **20.40%**  
51 a 200 parejas: **8.9%**  
Más de 200 parejas: **13.30%**  
No sabe / No contesta: **0.60%**

Homosexual: N=659

0: **0.20%**  
1: **22.80%**  
2 a 5: **29.90%**  
6 a 10: **15.00%**  
11 a 50: **24.70%**  
51 a 200 parejas: **6.1%**  
Más de 200 parejas: **0.80%**  
No sabe / No contesta: **0.60%**

Bisexual N=98

0: **3.10%**  
1: **16.30%**  
2 a 5: **39.80%**  
6 a 10: **19.40%**  
11 a 50: **14.30%**  
51 a 200 parejas: **6.10%**  
Más de 200 parejas: **1.00%**  
No sabe / No contesta: **0.00%**

Travestis: N=182

0: **0%**  
1: **0.50%**  
2 a 5: **0.50%**  
6 a 10: **3.30%**  
11 a 50: **8.20%**  
51 a 200 parejas: **20.90%**  
Más de 200 parejas: **65.40%**  
No sabe / No contesta: **1.10%**

## ***Distribución de encuestados según sexo de las personas con quienes tuvo relaciones sexuales a lo largo de su vida por auto nominación sexual***

### ***Personas con VIH***

**2006.** Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Por auto nominación sexual:

Heterosexual mujer: N=285

Exclusivamente con varones: **95.1%**

Exclusivamente con mujeres: **0.7%**

Con hombres y con mujeres: **2.1%**

Exclusivamente con travestis: **0.0%**

Con travestis y/o con hombres y/o con mujeres: **0.4%**

No tuvo relaciones sexuales: **1.1%**

NC: **0.7%**

Heterosexual varón: N=333

Exclusivamente con varones: **4.2%**

Exclusivamente con mujeres: **85.6%**

Con hombres y con mujeres: **4.2%**

Exclusivamente con travestis: **0.6%**

Con travestis y/o con hombres y/o con mujeres: **2.7%**

No tuvo relaciones sexuales: **1.8%**

NC: **0.9%**

No heterosexual varón: N=176

Exclusivamente con varones: **50.0%**

Exclusivamente con mujeres: **1.1%**

Con hombres y con mujeres: **41.5%**

Exclusivamente con travestis: **0.0%**

Con travestis y/o con hombres y/o con mujeres: **6.3%**

No tuvo relaciones sexuales: **0.0%**

NC: **1.1%**

Trans: N=23

Exclusivamente con varones: **82.6%**

Exclusivamente con mujeres: **4.3%**

Con hombres y con mujeres: **8.7%**

Exclusivamente con travestis: **0.0%**

Con travestis y/o con hombres y/o con mujeres: **4.3%**

No tuvo relaciones sexuales: **0.0%**

NC: **0.0%**

## ***Encuestados que conviven o están en pareja. Distribución según estado serológico de la pareja***

### ***Personas con VIH***

**2006.** Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Según sexo y orientación:

Mujeres: N=169

Seronegativo: **44.4%**

Seropositivo: **42.0%**  
No sabe: **13.6%**  
Varones heterosexuales: N=172  
Seronegativo: **45.1%**  
Seropositivo: **47.2%**  
No sabe: **7.7%**  
GBT: N=74  
Seronegativo: **37.8%**  
Seropositivo: **46.0%**  
No sabe: **16.2%**

## ***Personas que conviven actualmente con su pareja***

### ***Población General***

**2008.** Nacional (Jorrat, 2008)

Total: N= 4000

Conviven: **53%** No conviven: **47%**

Por sexo:

Hombres

Conviven: **52%** No conviven: **48%** N= 1995

Mujeres:

Conviven: **55%** No conviven: **45%** N= 2005

Por grupo de edad:

15 a 19 : Conviven **7%**. No conviven **93%** N=492

20 a 24: Conviven **31%**. No conviven **69%** N= 745

25 a 34: Conviven **62%**. No conviven **38%** N= 1123

35 a 34: Conviven **74%**. No conviven **26%** N= 765

45 a 54: Conviven **71%**. No conviven **29%** N= 543

55 a 69: Conviven **67%**. No conviven **33%** N= 332

## ***Situación de convivencia según tipo de pareja***

### ***Población General***

**2008.** Nacional (Jorrat, 2008)

Total: N=4000

Solo pareja estable: **66%**

Con parejas ocasionales: **20%**

Sin pareja-nc: **14%**

## **Edad de comienzo de la convivencia con pareja actual, según sexo y grupo de edad**

### **Población General**

**2008. Nacional (Jorrat, 2008) Total: N= 2132**

Menos de 18 años: **10%**  
18 a 24 años: **54%**  
25 a 34 años: **32%**  
35 o más años: **4%**

Por sexo:

Masculino: N=1036

Menos de 18 años: **6%**  
18 a 24 años: **48%**  
25 a 34 años: **41%**  
35 o más años: **5%**

Femenino: N=1096

Menos de 18 años: **6%**  
18 a 24 años: **48%**  
25 a 34 años: **41%**  
35 o más años: **5%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=34

Menos de 18 años: **74%**  
18 a 24 años: **26%**  
25 a 34 años: **sin dato**  
35 o más años: **sin dato**

20 a 24: N=228

Menos de 18 años: **20%**  
18 a 24 años: **80%**  
25 a 34 años: **sin dato**  
35 o más años: **sin dato**

25 a 34: N=699

Menos de 18 años: **9%**  
18 a 24 años: **57%**  
25 a 34 años: **33%**  
35 o más años: **1%**

35 a 44: N=560

Menos de 18 años: **8%**  
18 a 24 años: **47%**  
25 a 34 años: **38%**  
35 o más años: **7%**

45 a 54: N=387

Menos de 18 años: **6%**  
18 a 24 años: **47%**  
25 a 34 años: **39%**



35 o más años: **8%**  
55 a 69: N=224  
Menos de 18 años: **5%**  
18 a 24 años: **52%**  
25 a 34 años: **35%**  
35 o más años: **8%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=140  
Menos de 18 años: **22%**  
18 a 24 años: **52%**  
25 a 34 años: **22%**  
35 o más años: **4%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=873  
Menos de 18 años: **16%**  
18 a 24 años: **57%**  
25 a 34 años: **24%**  
35 o más años: **3%**

Secundaria completa: N=502  
Menos de 18 años: **6%**  
18 a 24 años: **60%**  
25 a 34 años: **31%**  
35 o más años: **3%**

Terciaria incompleta / Universitaria incompleta: N=279  
Menos de 18 años: **1%**  
18 a 24 años: **55%**  
25 a 34 años: **39%**  
35 o más años: **5%**

Terciaria completa / Universitaria completa: N=338  
Menos de 18 años: **3%**  
18 a 24 años: **39%**  
25 a 34 años: **51%**  
35 o más años: **7%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: N=1032  
Menos de 18 años: **14%**  
18 a 24 años: **59%**  
25 a 34 años: **24%**  
35 o más años: **3%**

Nivel medio: N=761  
Menos de 18 años: **7%**  
18 a 24 años: **51%**  
25 a 34 años: **37%**  
35 o más años: **5%**

Nivel alto: N=339  
Menos de 18 años: **6%**  
18 a 24 años: **46%**  
25 a 34 años: **44%**  
35 o más años: **4%**

## ***Distribución de la población encuestada (iniciada sexualmente) según prácticas sexuales en los últimos 12 meses por región***

### ***Personas con VIH***

2006. Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Total: N=818

Si con mi pareja estable: **47.8%**

Si, con mi pareja estable y con parejas ocasionales: **10.4%**

Si, pero solo con parejas ocasionales: **24.2%**

No tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses: **17.1%**

No contesta: **0.5%**

Por área geográfica:

AMBA: N=474

Si con mi pareja estable: **49.6%**

Si, con mi pareja estable y con parejas ocasionales: **10.5%**

Si, pero solo con parejas ocasionales: **23.0%**

No tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses:

**16.5%**

No contesta: **0.4%**

Pampeana: N=165

Si con mi pareja estable: **50.3%**

Si, con mi pareja estable y con parejas ocasionales: **10.3%**

Si, pero solo con parejas ocasionales: **27.3%**

No tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses:

**10.9%**

No contesta: **1.2%**

Cuyo Patagonia: N=60

Si con mi pareja estable: **51.7%**

Si, con mi pareja estable y con parejas ocasionales: **13.3%**

Si, pero solo con parejas ocasionales: **18.3%**

No tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses:

**16.7%**

No contesta: **0.0%**

NOA: N=60

Si con mi pareja estable: **28.3%**

Si, con mi pareja estable y con parejas ocasionales: **5.0%**

Si, pero solo con parejas ocasionales: **23.3%**

No tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses:

**43.3%**

No contesta: **0.0%**  
NEA: N=59  
Si con mi pareja estable: **42.4%**  
Si, con mi pareja estable y con parejas ocasionales: **11.9%**  
Si, pero solo con parejas ocasionales: **32.2%**  
No tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses:  
**13.6%**  
No contesta: **0.0%**

## ***Distribución de la población encuestada (iniciados sexualmente) según practicas sexuales en los últimos 12 meses por orientación sexual***

### ***Personas con VIH***

2006. Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Total: N=818  
Si, con mi pareja estable: **47.8%**  
Si, con mi pareja estable y con parejas ocasionales: **10.4%**  
Si, pero solo con parejas ocasionales: **24.2%**  
No tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses: **17.1%**  
No contesta: **0.5%**

Por sexo y orientación:

Mujer: N=290  
Si, con mi pareja estable: **62.1%**  
Si, con mi pareja estable y con parejas ocasionales: **3.8%**  
Si, pero solo con parejas ocasionales: **10.0%**  
No tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses:  
**22.8%**  
No contesta: **1.4%**  
Varón heterosexual: N=329  
Si, con mi pareja estable: **46.5%**  
Si, con mi pareja estable y con parejas ocasionales: **11.8%**  
Si, pero solo con parejas ocasionales: **26.0%**  
No tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses:  
**15.7%**  
No contesta: **0.0%**  
GBT: N=199  
Si, con mi pareja estable: **28.9%**  
Si, con mi pareja estable y con parejas ocasionales: **17.8%**  
Si, pero solo con parejas ocasionales: **42.1%**  
No tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses:  
**11.2%**

No contesta: **0.0%**

## ***Inicio de las relaciones sexuales - Personas que mantuvieron relaciones sexuales alguna vez***

### ***Población general***

**2008.** Nacional (Jorrat, 2008)

Total: N=4000

Si: **93%** No: **7%**

Por sexo:

Hombres: N=1995

Si: **95%** No: **5%**

Mujeres: N=2005

Si: **92%** No: **8%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=492

Si: **63%** No: **37%**

20 a 24: N=745

Si: **93%** No: **7%**

25 a 34: N=1123

Si: **98%** No: **2%**

35 a 44: N= 765

Si: **99%** No: **1%**

45 a 54: N=543

Si: **100%** No: **0%**

55 a 69: N=332

Si: **99%** No: **0%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=226

Si: **97%** No: **3%**

Primaria completa, secundaria incompleta: N=1644

Si: **90%** No: **10%**

Secundaria completa: N=883

Si: **97%** No: **3%**

Terciaria incompleta, universitaria incompleta: N=699

Si: **92%** No: **8%**

Por nivel de ingreso familiar

Ingreso Bajo: N= 2038

Si: **92%** No: **8%**

Ingreso medio: N=1377

Si: **94%** No: **6%**

Ingreso alto: N= 585  
Si: **96%** No: **4%**

## ***Edad de inicio de relaciones sexuales***

### ***Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)***

**2007.** Bariloche Mar del Plata, Córdoba, Rosario y AMBA.  
N= 307 Varones= 219 (Barron, 2008)

La edad de la primera relación sexual fue

< 14 años: **29%**  
15 a 18 años: **39%**  
19 ó más: **31%**

Primera relación sexual con penetración anal, (con hombres o travestis)

< 16 años: **47 %**  
< 14 años: **29%**

Relaciones sexuales con mujeres

En algún momento de su vida: **48%**  
< 17 años: **65%**

### ***Usuarios de droga***

**2007.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2008) N=355

Global

14 o menos años: **51.6%**  
15-16 años: **30.1%**  
17-19 años: **14.6%**  
20-25 años: **1.4%**  
No sabe/no contesta: **2.3%**

Por sexo:

Hombres: N=287

14 o menos años: **54.7%**  
15-16 años: **28.9%**  
17-19 años: **13.2%**  
20-25 años: **1.7%**  
No sabe/no contesta: **1.4%**

Mujeres: N=68

14 años o menos: **38.3%**  
15-16 años: **35.3%**  
17-19 años: **20.2%**

20-25 años: **0%**  
 No sabe/no contesta: **5.9%**

Por participación en programas de reducción de daños.

14 años o menos:  
 Participan **44.6%** N=83.  
 No participan **53.3%** N= 255.

15 a 16 años:  
 Participan **32.5%** N=83.  
 No participan **30.2%** N= 255.

17-19 años:  
 Participan **13.3%** N=83.  
 No participan **14.5%** N= 255.

20-25 años:  
 Participan **3.6%** N=83.  
 No participan **0.8%** N= 255.

No sabe/no contesta:  
 Participan **6.0%** N=83.  
 No participan **1.2%** N= 255.

Por edad

14 años o menos:  
 15-24 años: **63.4%** N=153  
 25-34 años: **47.3%** N=129  
 35 años y mas: **34.2%** N=73

15 a 16 años:  
 15-24 años: **25.5%** N=153  
 25-34 años: **34.9%** N=129  
 35 años y mas: **31.5%** N=73

17-19 años:  
 15-24 años: **7.8%** N=153  
 25-34 años: **13.2%** N=129  
 35 años y mas: **31.5%** N=73

20-25 años:  
 15-24 años: **2.6%** N=153  
 25-34 años: **1.6%** N=129  
 35 años y mas: **2.7%** N=73

Por nivel de instrucción.

14 años o menos:  
 Nivel de instrucción hasta primaria incompleta: **59.5%**  
 N=37  
 Nivel de instrucción primaria completa-secundaria  
 incompleta: **56.1%** N=244  
 Nivel de instrucción secundaria incompleta y mas: **32.4%**  
 N=74

15 a 16 años:  
 Nivel de instrucción hasta primaria incompleta: **21.6%**  
 N=37  
 Nivel de instrucción primaria completa-secundaria  
 incompleta: **29.9%** N=244

Nivel de instrucción secundaria incompleta y mas: **35.1%**  
 N=74

17-19 años:  
 Nivel de instrucción hasta primaria incompleta: **13.5%**  
 N=37  
 Nivel de instrucción primaria completa-secundaria  
 incompleta: **11.9%** N=244  
 Nivel de instrucción secundaria incompleta y mas: **24.3%**  
 N=74

20-25 años:  
 Nivel de instrucción hasta primaria incompleta: **0%** N=37  
 Nivel de instrucción primaria completa-secundaria  
 incompleta: **0.4%** N=244  
 Nivel de instrucción secundaria incompleta y mas: **5.4%**  
 N=74

No sabe no contesta  
 Nivel de instrucción hasta primaria incompleta: **5.4%** N=37  
 Nivel de instrucción primaria completa-secundaria  
 incompleta: **1.6%** N=244  
 Nivel de instrucción secundaria incompleta y mas: **2.7%** N=74

### *Población Trans*

**2007.** Bariloche Mar del Plata, Córdoba, Rosario y AMBA. N= 88. (Barrón, 2008)

La edad de la primera relación sexual fue  
 < 13 años: **30%**

### *Población General*

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008)

Nacional: N=3693

14 años o menos: **17%**  
 15 a 16 años: **34%**  
 17 a 19 años: **36%**  
 20 a 24 años: **11%**  
 25 a 29 años: **2%**  
 30 años y más: **0%**

Por sexo:

Masculino: N=1873

14 años o menos: **27%**  
 15 a 16 años: **39%**  
 17 a 19 años: **28%**  
 20 a 24 años: **5%**  
 25 a 29 años: **1%**  
 30 años y más: **0%**

Femenino: N=1820

14 años o menos: **7%**

15 a 16 años: **28%**  
17 a 19 años: **45%**  
20 a 24 años: **18%**  
25 a 29 años: **2%**  
30 años y más: **0%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=308  
14 años o menos: **27%**  
15 a 16 años: **54%**  
17 a 19 años: **19%**  
20 a 24 años: **0%**  
25 a 29 años: **0%**  
30 años y más: **0%**

20 a 24: N=691  
14 años o menos: **15%**  
15 a 16 años: **44%**  
17 a 19 años: **36%**  
20 a 24 años: **5%**  
25 a 29 años: **0%**  
30 años y más: **0%**

25 a 34: N=1089  
14 años o menos: **15%**  
15 a 16 años: **29%**  
17 a 19 años: **41%**  
20 a 24 años: **13%**  
25 a 29 años: **2%**  
30 años y más: **0%**

35 a 44: N=751  
14 años o menos: **17%**  
15 a 16 años: **30%**  
17 a 19 años: **38%**  
20 a 24 años: **12%**  
25 a 29 años: **3%**  
30 años y más: **0%**

45 a 54: N=532  
14 años o menos: **18%**  
15 a 16 años: **28%**  
17 a 19 años: **36%**  
20 a 24 años: **15%**  
25 a 29 años: **2%**  
30 años y más: **1%**

55 a 69: N=322  
14 años o menos: **15%**  
15 a 16 años: **25%**  
17 a 19 años: **33%**  
20 a 24 años: **21%**  
25 a 29 años: **6%**  
30 años y más: **0%**



Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N= 216

14 años o menos: **32%**

15 a 16 años: **31%**

17 a 19 años: **26%**

20 a 24 años: **9%**

25 a 29 años: **2%**

30 años y más: **0%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N= 1460

14 años o menos: **23%**

15 a 16 años: **40%**

17 a 19 años: **29%**

20 a 24 años: **7%**

25 a 29 años: **1%**

30 años y más: **0%**

Secundaria completa: N=849

14 años o menos: **14%**

15 a 16 años: **34%**

17 a 19 años: **40%**

20 a 24 años: **10%**

25 a 29 años: **2%**

30 años y más: **0%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N= 641

14 años o menos: **9%**

15 a 16 años: **30%**

17 a 19 años: **46%**

20 a 24 años: **13%**

25 a 29 años: **2%**

30 años y más: **0%**

Terciaria completa / universitaria completa: N=527

14 años o menos: **7%**

15 a 16 años: **21%**

17 a 19 años: **43%**

20 a 24 años: **25%**

25 a 29 años: **4%**

30 años y más: **0%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: N=1849

14 años o menos: **20%**

15 a 16 años: **34%**

17 a 19 años: **34%**

20 a 24 años: **10%**

25 a 29 años: **2%**

30 años y más: **0%**

Nivel medio: N=1285

14 años o menos: **14%**

15 a 16 años: **32%**

17 a 19 años: **39%**

20 a 24 años: **13%**  
25 a 29 años: **2%**  
30 años y más: **0%**  
Nivel alto: N=559  
14 años o menos: **14%**  
15 a 16 años: **35%**  
17 a 19 años: **38%**  
20 a 24 años: **11%**  
25 a 29 años: **2%**  
30 años y más: **0%**

## ***Personas que hicieron algo para evitar contraer el sida desde que escucharon hablar del tema***

### ***Poblacion general***

**2008.** Nacional (Jorrat, 2008)

Total: N=4000

Si: **67%**; No: **33%**

Por sexo:

Hombres: 1995

Si: **73%**; No: **27%**

Mujeres: 2005

Si: **60%**; No: **40%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=492

Si: **61%**; No: **39%**

20 a 24: N=745

Si: **76%**; No: **24%**

25 a 34: N=1123

Si: **77%**; No: **23%**

35 a 44: N=765

Si: **65%**; No: **35%**

45 a 54: (N=543)

Si: **58%**; No: **42%**

55 a 69: (N=332)

Si: **39%**; No: **61%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=226

Si: **41%**; No: **59%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=1644

Si: **58%**; No: **42%**

Secundaria completa: N=883

Si: **72%**; No: **28%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=699  
Si: **82%**; No: **18%**  
Terciaria completa / universitaria completa: (N=548)  
Si: **76%**; No: **24%**

Por nivel de ingreso familiar:  
Nivel bajo: (N=2038)  
Si: **61%**; No: **39%**  
Nivel medio: N=1377)  
Si: **71%**; No: **29%**  
Nivel alto: N=585  
Si: **77%**; No: **23%**

## ***Tipo de conductas adoptadas para evitar contraer el VIH***

### ***Poblacion general***

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008)

Total: N=2663

Conductas en relación al sexo: **91%**  
Conductas en relación con evitar contacto c/sangre: **8%**  
Conductas para informarse o controlarse: **6%**  
Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**

Por sexo:

Masculino: N=1457

Conductas en relación al sexo: **95%**  
Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **5%**  
Conductas para informarse o controlarse: **3%**  
Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**

Femenino: N=1206

Conductas en relación al sexo: **87%**  
Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **11%**  
Conductas para informarse o controlarse: **8%**  
Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=296

Conductas en relación al sexo: **90%**  
Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **8%**  
Conductas para informarse o controlarse: **4%**  
Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**

20 a 24: N=569

Conductas en relación al sexo: **96%**  
Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **5%**  
Conductas para informarse o controlarse: **5%**

- Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**
- 25 a 34: N=858
  - Conductas en relación al sexo: **92%**
  - Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **7%**
  - Conductas para informarse o controlarse: **7%**
  - Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**
- 35 a 44: N=497
  - Conductas en relación al sexo: **92%**
  - Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **8%**
  - Conductas para informarse o controlarse: **4%**
  - Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**
- 45 a 54: N=314
  - Conductas en relación al sexo: **86%**
  - Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **10%**
  - Conductas para informarse o controlarse: **5%**
  - Conductas en relación con consumo de drogas: **0%**
- 55 a 69: N= 129
  - Conductas en relación al sexo: **83%**
  - Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **10%**
  - Conductas para informarse o controlarse: **9%**
  - Conductas en relación con consumo de drogas: **0%**

Por nivel de instrucción:

- Primaria incompleta: N=92
  - Conductas en relación al sexo: **88%**
  - Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **4%**
  - Conductas para informarse o controlarse: **8%**
  - Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**
- Primaria completa / secundaria incompleta: N=952
  - Conductas en relación al sexo: **90%**
  - Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **6%**
  - Conductas para informarse o controlarse: **5%**
  - Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**
- Secundaria completa: N=637
  - Conductas en relación al sexo: **94%**
  - Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **5%**
  - Conductas para informarse o controlarse: **5%**
  - Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**
- Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=570
  - Conductas en relación al sexo: **92%**
  - Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **9%**
  - Conductas para informarse o controlarse: **7%**
  - Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**
- Terciaria completa / universitaria completa: N=412
  - Conductas en relación al sexo: **88%**
  - Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **13%**
  - Conductas para informarse o controlarse: **7%**
  - Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel Bajo: N=1243

Conductas en relación al sexo: **91%**

Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **7%**

Conductas para informarse o controlarse: **5%**

Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**

Nivel medio: N=973

Conductas en relación al sexo: **92%**

Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **8%**

Conductas para informarse o controlarse: **6%**

Conductas en relación con consumo de drogas: **1%**

Nivel alto: N=447

Conductas en relación al sexo: **91%**

Conductas en relación c/evitar contacto c/sangre: **11%**

Conductas para informarse o controlarse: **6%**

Conductas en relación con consumo de drogas: **2%**

## ***Personas que buscaron algún tipo de tratamiento cuando tuvieron síntomas de ITS, según sexo y edad***

### ***Población general***

**2008.** Nacional (Jorrat, 2008)

Total: N= 470

Si: **79%**; No: **21%**

Por sexo:

Hombres: N= 47

Si: **72%** ; No: **28%**

Mujeres: (N=423)

Si: **80%**; No: **20%**

Por grupo de edad:

15 a 19: (N= 49)

Si: **57%**; No: **43%**

20 a 24: (N= 119)

Si: **73%**; No: **27%**

25 a 34: (N=177)

Si: **85%**; No: **15%**

35 a 44: (N= 80)

Si: **84%**; No: **16%**

45 a 54: (N=34)

Si: **94%**; No: **6%**

55 a 69: (N=11)

Si: **82%**; No: **18%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=26

Si: **81%**; No: **19%**  
Primaria completa / Secundaria incompleta N=182  
Si: **72%**; No: **28%**  
Secundaria completa: N=118  
Si: **83%**; No: **17%**  
Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=83  
Si: **82%**; No: **18%**  
Terciaria completa / universitaria completa: (N=61)  
Si: **90%**; No: **10%**

Por nivel de ingreso familiar:  
Nivel bajo: (N=255)  
Si: **76%**; No: **24%**  
Nivel medio: (N=166)  
Si: **84%**; No: **16%**  
Nivel alto: (N= 49)  
Si: **80%**; No: **20%**

## **Uso de drogas - Frecuencia de utilización de drogas endovenosas**

### **Usuarios de drogas**

**2007.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2008) N= 79.

- Sólo una vez por mes: **8%**
  - participa en programa de reducción de daños: – .
  - Sin participación en los programas de reducción de daños: **16,7%**
  - sexo masculino: **5,3%**
  - sexo femenino: **16,7%**
- 2 a 3 veces por mes: **20%**
  - participa en programa de reducción de daños: **16,7%**
  - Sin participación en los programas de reducción de daños: **25%**
  - sexo masculino: **26,3%**
  - sexo femenino: **0%**
- 1 vez por semana: **8%**
  - Participa en programa de reducción de daños: **8,3%**
  - Sin participación en los programas de reducción de daños: **8,3%**
  - sexo masculino: **10,5%**
  - sexo femenino: **0%**
- 2 a 3 veces por semana: **24%**
  - participa en programa de reducción de daños: **16,7%**
  - Sin participación en los programas de reducción de daños: **33,3%**
  - sexo masculino: **21,1%**
  - sexo femenino: **33,2%**
- 4 a 6 veces por semana: **16%**
  - participa en programa de reducción de daños: **33,3%**
  - Sin participación en los programas de reducción de daños: **0%**

- sexo masculino: **15,8%**
- sexo femenino: **16,7%**
- 1 vez por día: **8%**
  - participa en programa de reducción de daños: **8,3%**
  - Sin participación en los programas de reducción de daños: **8,3%**
  - sexo masculino: **5,3%**
  - sexo femenino: **16,7%**
- 2 a 3 veces por día: **12%**
  - participa en programa de reducción de daños: **8,3%**
  - Sin participación en los programas de reducción de daños: **8,3%**
  - sexo masculino: **10,5%**
  - sexo femenino: **16,7%**
- 4 o más veces por día: **4%**
  - participa en programa de reducción de daños: **8,3%**
  - Sin participación en los programas de reducción de daños: **0%**
  - sexo masculino: **5,3%**
  - sexo femenino: **0%**

## ***Edad de inicio en el consumo por vía inyectable***

### ***Usuarios de drogas***

**2006.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, Diz, 2008). N= 79.

- 14 a 17 años: **39.2%**
- 18 a 19 años: **21.5%**
- 20 a 22 años: **17.7%**
- 23 a 26 años: **11.4%**
- Mas de 27 años: **10.1%**

## ***La última vez que te inyectaste, ¿usaste aguja/jeringa usada antes por otro?***

### ***Usuarios de drogas***

**2006.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2007) N= 79

Sí **31,6%**; No: **64,6%**

Por participación en programa de reducción de daños

Participan N= 26

Si: **19.2%**; No: **80.8%**

No participan N= 53

Si: **38%**; No: **56%**. No sabe/no contesta: **6%**

#### Por sexo

Sexo masculino N= 64

Si: **32.8%**; No: **64.1%**; No sabe/no contesta: **3.1%**

Sexo femenino N= 15

Si: **26.7%**; No: **66.7%**; No sabe/no contesta: **6.7%**

#### Por edad

Edad hasta 24 años: N= 11

Si: **9.1%**; No: **90.9%**.

Edad entre 25 y 34 años N= 32

Si: **31.3%**; No: **65.6%**; No sabe/no contesta: **3.1%**

Edad mayor a 35 años. N= 36

Si: **38.9%**; No: **55.6%**; No sabe/no contesta: **5.6%**

#### Nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta N= 7

No: **100%**.

Primaria completa-secundaria incompleta N= 62

Si: **37.1%**; No: **58.1%**; No sabe/no contesta: **4.8%**

Secundaria incompleta y mas N= 10

Si: **20%**; No: **80%**.

## ***Frecuencia con la que compartieron equipos de inyección***

### ***Usuarios de drogas***

**2006.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2007)

Nunca: **53%**

Ocasionalmente: **28%**

La mayoría de las veces: **6%**

La mitad de las veces: **5%**

Por Cantidad de personas con las que compartieron equipos de inyección

Con 1 personas: **33%**

Con 2 personas: **25%**

Con 3 personas: **13%**

Con 4 ó > personas: **22%**

## ***Limpieza de agujas y jeringas***



## *Usuarios de drogas*

**2006.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2007)

Siempre: **52.6%** (20/38)

La mitad de las veces: **18.4%** (7/38)

Ocasionalmente: **18.4%** (7/38)

Nunca: (4/38) **10.5%** N= 38

## *Material de limpieza de agujas y jeringas*

### *Usuarios de drogas*

**2006.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2007)

Con agua fría: **64.1%** (25/39)

Con agua caliente: **10%** (4/39)

Hirviéndolas: **5%** (2/39)

Con lavandina: **82%** (32/39)

Alcohol: **7%** (3/39)

## *Posibilidad de conseguir equipo nuevo, no usado, cuando lo necesita*

### *Usuarios de drogas*

**2006.** Rosario, Mendoza, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Mendes, 2007) N= 79

Sí: **77%**; No: **20,3%**

No sabe /no contesta: **2.7%**

Por participación en programas de reducción de daños N= 26

Participan

Si: **88.5%**; No: **11.5%**

No participan N= 53

Si: **73.9%**; No: **21.8%**.

No sabe/no contesta: 4.3%

Por sexo

Sexo masculino N= 64

Si: **76.6%**; No: **20.3.1%**.

No sabe/no contesta: **3.4%**

Sexo femenino N= 15

Si: **80%**; No: **20%**.

Por edad:

Edad hasta 24 años N= 11  
Si: **81%**; No: **18%**.  
Edad entre 25 y 34 años N= 32  
Si: **80.4%**; No: **19.3%**.  
Edad mayor a 35 años. N= 36  
Si: **71.9%**; No: **21.9%**; No sabe/no contesta: **6.2%**

Por nivel de instrucción

Nivel de instrucción hasta primaria incompleta N= 7  
Si: **71%**; No: **28.6%**.  
Nivel de instrucción primaria completa-secundaria  
incompleta N= 62  
Si: **73.7%**; No: **22.8%**; No sabe/no contesta: **3.5%**  
Nivel de instrucción secundaria incompleta y mas N= 10  
Si: 100%.

## ***Causas de infección del VIH - Situación posible de infección por VIH informada por ellos***

### ***Personas con VIH***

**2006.** Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Total: N= 841

Relaciones sexuales: **78.0%**  
Heterosexuales: **55.1%**  
No-heterosexuales: **22.9%**  
Uso de drogas inyectables: **15.1%**  
Transfusión/productos anti hemofílicos: **5.2%**  
Nació con VIH: **1.3%**  
Otros: **4.6%**  
No sabe: **4.2%**  
NC: **0.1%**

Por región geográfica:

AMBA: N=486  
Relaciones sexuales: **75.9%**  
Heterosexuales: **54.7%**  
No-heterosexuales: **21.2%**  
Uso de drogas inyectables: **17.7%**  
Transfusión/productos anti hemofílicos: **5.1%**  
Nació con VIH: **1.0%**  
Otros: **4.7%**  
No sabe: **4.1%**  
NC: **0.2%**

Pampeana: N=175

Relaciones sexuales: **73.7%**

Heterosexuales: **51.4%**

No-heterosexuales: **22.3%**

Uso de drogas inyectables: **17.7%**

Transfusión/productos anti hemofílicos: **4.6%**

Nació con VIH: **2.9%**

Otros: **2.9%**

No sabe: **4.6%**

NC: **0.0%**

Cuyo Patagonia: N=60

Relaciones sexuales: **81.7%**

Heterosexuales: **53.3%**

No-heterosexuales: **28.3%**

Uso de drogas inyectables: **11.7%**

Transfusión/productos anti hemofílicos: **5.0%**

Nació con VIH: **1.7%**

Otros: **3.3%**

No sabe: **5.0%**

NC: **0.0%**

NOA: N=60

Relaciones sexuales: **90.0%**

Heterosexuales: **70.0%**

No-heterosexuales: **20.0%**

Uso de drogas inyectables: **1.7%**

Transfusión/productos anti hemofílicos: **6.7%**

Nació con VIH: **0.0%**

Otros: **10.0%**

No sabe: **5.0%**

NC: **0.0%**

NEA: N= 60

Relaciones sexuales: **91.7%**

Heterosexuales: **55.0%**

No-heterosexuales: **36.7%**

Uso de drogas inyectables: **3.3%**

Transfusión/productos anti hemofílicos: **6.7%**

Nació con VIH: **0.0%**

Otros: **5.0%**

No sabe: **1.7%**

NC: **0.0%**

## Uso Del Preservativo

### Uso preservativo en la primera relación sexual

#### Población general

**2008.** Nacional (Jorrat, 2008)

Nacional: N=3710

Si: **49%** No: **51%**

Por sexo:

Masculino: N=1880

Si: **48%** No: **52%**

Femenino: N=1830

Si: **50%** No: **50%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=308

Si: **82%** No: **18%**

20 a 24: N=695

Si: **73%** No: **27%**

25 a 34: N=1097

Si: **59%** No: **41%**

35 a 44: N=748

Si: **32%** No: **68%**

45 a 54: N=539

Si: **21%** No: **79%**

55 a 69: N=323

Si: **19%** No: **81%**

Según nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=219

Si: **21%** No: **79%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=1466

Si: **40%** No: **60%**

Secundaria completa: N=853

Si: **55%** No: **45%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=643

Si: **68%** No: **32%**

Terciaria completa / universitaria completa: N=529

Si: **53%** No: **47%**

Por nivel de ingreso familiar

Ingreso bajo: N=1862

Si: **43%** No: **57%**

Ingreso medio: N= 1291  
Si: **55%** No: **45%**  
Ingreso alto: N=557  
Si: **57%** No: **43%**

## **Uso del preservativo en la última relación sexual con parejas estables**

### *Usuarios de drogas*

**2007.** Mendoza, Rosario, Neuquén y AMBA. (Mendes, 2007)

Si utilizó: **43.1%** N=355

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **37.3 %** N=83

No participa en PRD: **43.9 %** N=255

No sabe no contesta: **58.8 %** N=17

Por sexo

Masculino: **34.3 %** N=287

Femenino: **38.2%** N=68

Por grupo de edad

Hasta 24 años: **43.8 %** N= 153

25-34 años: **36.4 %** N= 129

35 años y más: **53.4 %** N= 73

Por nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta: **48.6 %** N= 37

Primaria completa-secundaria incompleta: **44.3 %** N= 244

Secundaria completa y más: **36.5 %** N= 74

No utilizo: **46.8%** N=355

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **55.4 %** N=83

No participa en PRD: **44.3 %** N=255

No sabe no contesta: **41.2 %** N=17

Por Sexo:

Masculino: **45.3 %** N=287

Femenino: **52.9%** N=68

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **41.2 %** N= 153

25-34 años: **58.1 %** N= 129

35 años y más: **38.4 %** N= 73

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **27 %** N= 37

Primaria completa-secundaria incompleta: **46.7 %** N= 244

Secundaria completa y más: **56.8 %** N= 74

Nunca tuvo: **9%** N: 355

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **6 %** N=83

No participa en PRD: **10.6 %** N=255

No sabe no contesta: **0 %** N=17

Por Sexo

Masculino: **9.8 %** N=287

Femenino: **5.9%** N=68

Por grupo de edad

Hasta 24 años: **13.1 %** N= 153

25-34 años: **5.4 %** N= 129

35 años y más: **6.8 %** N= 73

Por nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta: **21.6 %** N= 37

Primaria completa-secundaria incompleta: **8.2 %** N= 244

Secundaria completa y más: **5.4 %** N= 74

No sabe no contesta: **1.1%** N: 355

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **1.2 %** N=83

No participa en PRD: **1.2 %** N=255

No sabe no contesta: **0%** N=17

Por sexo

Masculino: **0.7 %** N=287

Femenino: **2.9%** N=68

Por grupo de edad

Hasta 24 años: **2 %** N= 153

25-34 años: **0 %** N= 129

35 años y más: **1.4 %** N= 73

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **2.7 %** N= 37

Primaria completa-secundaria incompleta: **0.8 %** N= 244

Secundaria completa y más: **1.4 %** N= 74

## *Población general*

**2008.** Nacional (Jorrat. 2008)

Total: N= 3101

Si: **40%** No: **60%**

Por sexo:

Hombres: N= 1537

Si: **39%** No: **61%**

Mujeres: N= 1564

Si: **40%** No: **60%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N= 231

Si: **71%** No: **29%**

20 a 24: N=555  
Si: **56%** No: **44%**  
25 a 34: N=979  
Si: **43%** No: **57%**  
35 a 44: N=665  
Si: **32%** No: **65%**  
45 a 54 N=446  
Si: **23%** No: **77%**  
55 a 69: N= 225

Por nivel de instrucción: N= 3101  
Primaria incompleta: N=161  
Si: **22%** No: **78%**  
Primaria completa / Secundaria incompleta: N=1219  
Si: **34%** No: **66%**  
Secundaria completa: N= 724  
Si: **44%** No: **56%**  
Terciaria incompleta / Universitaria incompleta: N=530  
Si: **53%** No: **47%**  
Terciaria completa / Universitaria completa: N=467  
Si: **39%** No: **61%**

Por nivel de ingreso familiar:  
Nivel bajo: N=1502  
Si: **38%** No: **62%**  
Nivel medio: N= 1105  
Si: **43%** No: **57%**  
Nivel alto: N=494  
Si: **38%** No: **62%**

## ***Uso de preservativo en la última relación sexual con pareja estable. Quien sugirió usar preservativo?***

### ***Usuarios de drogas***

**2007.** Mendoza, Rosario, Neuquén y AMBA (Mendes, 2007)  
Entrevistado: **37.4%** N=155  
Por Participación en programa de reducción de daños  
Participa en PRD: **38.7 %** N=31  
No participa en PRD: **36%** N=114  
No sabe no contesta: **40%** N=10  
Por sexo  
Masculino: **34.1 %** N=129  
Femenino: **50%** N=26  
Por grupo de edad:  
Hasta 24 años: **45.6 %** N= 68  
25-34 año: **33.3 %** N= 48

35 años y más: **25.6 %** N= 39  
Por nivel de instrucción:  
Hasta primaria incompleta: **38.9 %** N= 18  
Primaria completa-secundaria incompleta: **36.4 %** N= 110  
Secundaria completa y más: **37%** N= 27

Pareja: **12.9%** N=155

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **12.9 %** N=31

No participa en PRD: **14%** N=114

No sabe no contesta: **0%** N=10

Por sexo

Masculino: **14 %** N=129

Femenino: **7.7%** N=26

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **17.6 %** N= 68

25-34 años: **12.5 %** N= 48

35 años y más: **5.1 %** N= 39

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **16.7 %** N= 18

Primaria completa-secundaria incompleta: **12.7 %** N= 110

Secundaria completa y más: **11.1%** N= 27

Ambos: **49.7%** N:155

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **48.4 %** N=31

No participa en PRD: **49.1%** N=114

No sabe no contesta: **60%** N=10

Por sexo

Masculino 51.2 % N=129

Femenino 42.3% N=26

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **35.3 %** N= 68

25-34 años: **54.2 %** N= 48

35 años y más: **69.2 %** N= 39

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **44.4%** N= 18

Primaria completa-secundaria incompleta: **50 %** N= 110

Secundaria completa y más: **51.9%** N= 27

## ***Uso de preservativo en la ultima relación sexual con pareja ocasional***

### ***Usuario de drogas***

**2007.** Mendoza, Rosario, Neuquén, AMBA. (Mendes, 2008)

Uso de preservativo en la ultima relación sexual con pareja ocasional

Si utilizó 51% N: 355



Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD. 47 % N=83

No participa en PRD 52.9 % N=252

No sabe no contesta 41.2 % N=17

Sexo

Masculino 53.3 % N=287

Femenino 41.2% N=68

Por edad

Hasta 24 años. 57.5 % N= 153

25-34 años.41.1 % N= 129

35 años y más 54.8 % N= 73

Por nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta 43.2 % N= 37

Primaria completa-secundaria incompleta 50.4 %  
N= 244

Secundaria completa y más. 56.8 % N= 74

No utilizo 26.8% N: 355

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD. 41% N=83

No participa en PRD 22.7 % N=252

No sabe no contesta 17.6 % N=17

Sexo

Masculino 28.2 % N=287

Femenino 20.6% N=68

Por edad

Hasta 24 años. 26.8 % N= 153

25-34 años.29.5 % N= 129

35 años y más 21.9 % N= 73

Por nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta 29.7 % N= 37

Primaria completa-secundaria incompleta 26.7 %  
N= 244

Secundaria completa y más. 27 % N= 74

Nunca tuvo 19.7% N: 355

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD.10.8 % N=83

No participa en PRD 21.2 % N=255

No sabe no contesta 41.2 % N=17

Sexo

Masculino 15.7 % N=287

Femenino 36.8% N=68

Por edad

Hasta 24 años. 13.1 % N= 153

25-34 años.27.1 % N= 129

35 años y más 20.5 % N= 73

Por nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta 16.2 % N= 37

Primaria completa-secundaria incompleta 21.7 %  
N= 244  
Secundaria completa y más. 14.9 % N= 74

## ***Uso de preservativo en la última relación sexual con pareja ocasional. ¿Quién sugirió usar preservativo?***

### ***Usuario de drogas***

**2007.** Mendoza, Rosario, Neuquén, AMBA (Mendes, 2007) (N= 182)

Entrevistado: **56.1%** N:182

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **57.5 %** N=40

No participa en PRD: **54.8%** N=135

No sabe no contesta: **71.4%** N=7

Por sexo:

Masculino: **57.8 %** N=154

Femenino: **46.4%** N=28

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **59.1 %** N= 88

25-34 años: **55.6%** N= 54

35 años y más: **50 %** N= 40

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **56.3 %** N= 16

Primaria completa-secundaria incompleta: **55.5 %** N= 124

Secundaria completa y más: **57.1%** N= 42

Pareja: **6%** N:155

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **0 %** N=40

No participa en PRD: **8.1%** N=135

No sabe no contesta: **0%** N=7

Por sexo :

Masculino: **11 %** N=154

Femenino: **7.1%** N=28

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **5.7 %** N= 88

25-34 años: **7.4%** N= 54

35 años y más: **5 %** N= 40

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **0 %** N= 16

Primaria completa-secundaria incompleta: **8.1 %** N= 124

Secundaria completa y más: **2.4%** N= 42

Ambos: **31.3%** N:155

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **35 %** N=40

No participa en PRD: **30.4%** N=135  
No sabe no contesta: **28.6%** N=7  
Por sexo:  
Masculino: **6 %** N=154  
Femenino: **46.4%** N=28  
Por edad:  
Hasta 24 años: **26.1 %** N= 88  
25-34 años: **35.2%** N= 54  
35 años y más: **37.5 %** N= 40  
Por nivel de instrucción:  
Hasta primaria incompleta: **31.3 %** N= 16  
Primaria completa-secundaria incompleta: **29 %** N= 124  
Secundaria completa y más: **38.1%** N= 42

No sabe no contesta: **6.6%** N=155  
Por Participación en programa de reducción de daños  
Participa en PRD: **7.5 %** N=40  
No participa en PRD: **6.7%** N=135  
No sabe no contesta: **0%** N=7  
Por sexo:  
Masculino: **7.8 %** N=154  
Femenino: **0%** N=28  
Por edad:  
Hasta 24 años: **9.1 %** N= 88  
25-34 años: **1.9%** N= 54  
35 años y más: **7.5 %** N= 40  
Por nivel de instrucción:  
Hasta primaria incompleta: **12.5 %** N= 16  
Primaria completa-secundaria incompleta: **7.3 %** N= 124  
Secundaria completa y más: **2.4%** N= 42

## ***Motivo por el que no utilizo preservativo en la última relación sexual con pareja ocasional***

### ***Usuario de drogas***

**2007.** Mendoza, Rosario, Neuquén, AMBA (Mendes, 2007) N: 91

No tenían: **27.5 %**  
Por Participación en programa de reducción de daños  
Participa en PRD: **29%** N=31  
No participa en PRD: **28.1%** N=54  
No sabe no contesta: **0 %** N=3  
Por sexo :  
Masculino: **29.5%** N=78  
Femenino: **15.4%** N=13  
Por edad:

Hasta 24 años: **25 %** N= 39  
25-34 años: **33.3 %** N= 34  
35 años y más: **20%** N= 15

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **45.5 %** N= 10  
Primaria completa-secundaria incompleta: **21.3 %** N= 60  
Secundaria completa y más: **36.8%** N= 18

No le gusta usarlo: **29.2%** N= 91

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **38.1 %** N=45  
No participa en PRD: **21.8%** N=107  
No sabe no contesta: **66.7%** N=6

Por sexo :

Masculino: **31.6 %** N=122  
Femenino: **15.4%** N=36

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **28.2 %** N= 58  
25-34 años: **31.4 %** N= 72  
35 años y más: **26.7 %** N= 28

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **30%** N= 9  
Primaria completa-secundaria incompleta: **28.3 %** N= 107  
Secundaria completa y más: **31.6%** N= 42

No pensó que era necesario: **11.4%** N= 91

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **3.2 %** N=45  
No participa en PRD: **16.7%** N=107  
No sabe no contesta: **0%** N=6

Por sexo :

Masculino: **10.7 %** N=122  
Femenino: **15.4%** N=36

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **7.7 %** N= 58  
25-34 años: **5.9 %** N= 72  
35 años y más: **33.3 %** N= 28

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **10%** N= 9  
Primaria completa-secundaria incompleta: **11.7 %** N= 107  
Secundaria completa y más: **11.1%** N= 42

No lo tuvo presente: **15.9%** N= 91

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **16.1%** N=45  
No participa en PRD: **16.7%** N=107  
No sabe no contesta: **0%** N=6

Por sexo:

Masculino: **16 %** N=122  
Femenino: **15.4%** N=36

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **20.5 %** N= 58

25-34 años: **11.8 %** N= 72

35 años y más: **13.3 %** N= 28

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **10%** N= 9

Primaria completa-secundaria incompleta: **15 %** N= 107

Secundaria completa y más: **22.2%** N= 42

Quita placer:**10.2%** N: 91

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD **6.5 %** N=45

No participa en PRD: **13 %**N=107

No sabe no contesta: **0%** N=6

Por sexo :

Masculino: **10.7 %** N=122

Femenino: **7.7 %** N=36

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **7.7 %** N= 58

25-34 años: **17.6 %** N= 72

35 años y más: **0 %** N= 28

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **10%** N= 9

Primaria completa-secundaria incompleta:**10 %** N= 107

Secundaria completa y más: **11.1%** N= 42

Por inconciencia: **13.6 %** N: 91

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **6.5. %** N=45

No participa en PRD: **16.7%** N=107

No sabe no contesta: **33.3 %** N=6

Por sexo :

Masculino: **16%** N=122

Femenino: **0 %** N=36

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **25.6 %** N= 58

25-34 años: **5.9 %** N= 72

35 años y más: **0%** N= 28

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **20%** N= 9

Primaria completa-secundaria incompleta: **11.7%** N= 107

Secundaria completa y más: **16.7%** N= 42

## ***Población general***

**2008.** Nacional (Jorrat, 2008) N= 771

Si: **81%** No: **19%**

Por sexo:

Masculino: N= 617  
Si: **82%** No: **18%**  
Femenino: N= 154  
Si: **81%** No: **19%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N= 127  
Si: **87%** No: **13%**  
20 a 24: N= 238  
Si: **84%** No: **16%**  
25 a 34: N=209  
Si: **88%** No: **12%**  
35 a 44: N=107  
Si: **69%** No: **31%**  
45 a 54: N= 64  
Si: **73%** No: **27%**  
55 a 69: N= 28  
Si: **50%** No: **50%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=617  
Si: **52%** No: **48%**  
Primaria completa / secundaria incompleta: N=154  
Si: **75%** No: **25%**  
Secundaria completa: N= 127  
Si: **91%** No: **9%**  
Terciaria incompleta / Universitaria incompleta: N=238  
Si: **89%** No: **11%**  
Terciaria completa / Universitaria completa: N= 209  
Si: **87%** No: **13%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel Bajo: N= 107  
Si: **75%** No: **25%**  
Nivel medio: N=64  
Si: **87%** No: **13%**  
Nivel alto: N=26  
Si: **91%** No: **9%**

## ***Uso de preservativo la última vez que mantuvieron relaciones por dinero o drogas***

### ***Usuario de drogas***

**2007.** Mendoza, Rosario, Neuquen, AMBA (Mendes, 2007)

Si use: **22%**

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **16.9 %** N=83  
No participa en PRD: **23.9%** N=255  
No sabe no contesta: **17.6%** N=17

Por sexo :

Masculino: **23 %** N=287  
Femenino: **17.6%** N=68

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **19 %** N= 153  
25-34 años: **21.7 %** N= 129  
35 años y más: **28.8 %** N= 73

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **16.2%** N= 37  
Primaria completa-secundaria incompleta: **23.8%** N= 244  
Secundaria completa y más: **18.9%** N= 74

No use: **8.5%**

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **10.8 %** N=83  
No participa en PRD: **7.5%** N=255  
No sabe no contesta: **11.8%** N=17

Por sexo :

Masculino: **8.7 %** N=287  
Femenino: **7.4%** N=68

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **9.2 %** N= 153  
25-34 años: **8.5 %** N= 129  
35 años y más: **6.8 %** N= 73

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **16.2%** N= 37  
Primaria completa-secundaria incompleta: **7.4 %** N= 244  
Secundaria completa y más: **8.1%** N= 74

Nunca tuve relaciones por dinero o drogas: **69.5%**

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **69.9 %** N=83  
No participa en PRD: **67.8%** N=255  
No sabe no contesta: **70.6%** N=17

Por sexo:

Masculino: **67.6 %** N=287  
Femenino: **72.1%** N=68

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **70.6 %** N= 153  
25-34 años: **69%** N= 129  
35 años y más: **63 %** N= 73

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **64.9%** N= 37  
Primaria completa-secundaria incompleta: **68 %** N= 244  
Secundaria completa y más: **71.6 %** N= 74

## **Uso de preservativo en la última relación por dinero o drogas Quien sugirió usar preservativo?**

### **Usuario de drogas**

**2007.** Mendoza, Rosario, Neuquen, AMBA (Mendes, 2007)

Entrevistado: **64.5%** N: 79

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **73.3%** N=15

No participa en PRD: **63.9%** N=61

No sabe no contesta: **0%** N=3

Por sexo :

Masculino: **59.7 %** N=67

Femenino: **83.3%** N=12

Por grupo de edad:

Hasta 24 años: **75.9 %** N= 29

25-34 años: **58.6 %** N= 29

35 años y más: **52.4 %** N= 21

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **66.7 %** N= 6

Primaria completa-secundaria incompleta: **65.5 %** N= 58

Secundaria completa y más: **53.3%** N= 15

Pareja: **19%** N:155

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **0%** N=15

No participa en PRD: **24.6%** N=61

No sabe no contesta: **0%** N=3

Por sexo:

Masculino: **20.9%** N=67

Femenino: **8.3%** N=12

Por edad:

Hasta 24 años: **17.2 %** N= 29

25-34 años: **24.1 %** N= 29

35 años y más: **14.3%** N= 21

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **33.3 %** N= 6

Primaria completa-secundaria incompleta: **20.7 %** N= 58

Secundaria completa y más: **6.7%** N= 15

Ambos: **16.5%** N:155

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **20%** N=15

No participa en PRD: **11.5%** N=61

No sabe no contesta: **100%** N=3

Por sexo:

Masculino: **17.9%** N=67



Femenino: **8.3%** N=12  
Por edad  
Hasta 24 años: **6.9 %** N= 29  
25–34 años: **13.8 %** N= 29  
35 años y más: **33.3%** N= 21  
Por nivel de instrucción:  
Hasta primaria incompleta: **0 %** N= 6  
Primaria completa-secundaria incompleta: **13.8 %** N= 58  
Secundaria completa y más: **33.3%** N= 15

## ***Frecuencia de uso de preservativo en el último año con parejas estables***

### ***Población general***

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008). Nacional: N= 3095

Todas las veces: **24%**  
Casi siempre: **13%**  
A veces: **19%**  
Nunca: **44%**

Por sexo:

Masculino: N=1535  
Todas las veces: **24%**  
Casi siempre: **13%**  
A veces: **19%**  
Nunca: **44%**  
Femenino: N= 1560  
Todas las veces: **24%**  
Casi siempre: **12%**  
A veces: **19%**  
Nunca: **45%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N= 230  
Todas las veces: **51%**  
Casi siempre: **18%**  
A veces: **22%**  
Nunca: **9%**  
20 a 24: N=556  
Todas las veces: **34%**  
Casi siempre: **18%**  
A veces: **27%**  
Nunca: **21%**  
25 a 34: N= 979  
Todas las veces: **24%**  
Casi siempre: **17%**

A veces: **21%**  
Nunca: **38%**  
35 a 44: N= 662  
Todas las veces: **19%**  
Casi siempre: **9%**  
A veces: **18%**  
Nunca: **54%**  
45 a 54: N= 445  
Todas las veces: **13%**  
Casi siempre: **7%**  
A veces: **12%**  
Nunca: **68%**  
55 a 69: N= 223  
Todas las veces: **5%**  
Casi siempre: **1%**  
A veces: **4%**  
Nunca: **90%**

Por nivel de instrucción

Primaria incompleta: N= 160  
Todas las veces: **9%**  
Casi siempre: **6%**  
A veces: **17%**  
Nunca: **68%**  
Primaria incompleta / secundaria incompleta: N= 1215  
Todas las veces: **20%**  
Casi siempre: **11%**  
A veces: **19%**  
Nunca: **50%**  
Secundaria completa: N= 725  
Todas las veces: **25%**  
Casi siempre: **16%**  
A veces: **21%**  
Nunca: **38%**  
Terciaria incompleta / Universitaria incompleta: N=530  
Todas las veces: **36%**  
Casi siempre: **16%**  
A veces: **19%**  
Nunca: **29%**  
Terciaria completa / Universitaria completa: N=465  
Todas las veces: **25%**  
Casi siempre: **12%**  
A veces: **17%**  
Nunca: **46%**

Por nivel de ingreso familiar

Nivel bajo: N=1496  
Todas las veces: **21%**  
Casi siempre: **12%**  
A veces: **20%**

Nunca: **47%**  
Nivel medio: N= 1105  
Todas las veces: **27%**  
Casi siempre: **14%**  
A veces: **19%**  
Nunca: **40%**  
Nivel alto: N= 494  
Todas las veces: **23%**  
Casi siempre: **15%**  
A veces: **16%**  
Nunca: **46%**

## ***Frecuencia de uso de preservativo en el último año con parejas ocasionales***

### ***Población general***

**2008. Nacional. (Jorrat, 2008) Nacional: N=761**

Todas las veces: **63%**  
Casi siempre: **13%**  
A veces: **14%**  
Nunca: **10%**

Por sexo:

Masculino: N=608  
Todas las veces: **63%**  
Casi siempre: **13%**  
A veces: **15%**  
Nunca: **9%**

Femenino: N= 153  
Todas las veces: **65%**  
Casi siempre: **14%**  
A veces: **9%**  
Nunca: **12%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=124  
Todas las veces: **65%**  
Casi siempre: **19%**  
A veces: **12%**  
Nunca: **4%**

20 a 24: N= 235  
Todas las veces: **67%**  
Casi siempre: **12%**  
A veces: **16%**  
Nunca: **5%**

25 a 34: N= 205

Todas las veces: **69%**  
Casi siempre: **10%**  
A veces: **14%**  
Nunca: **7%**

35 a 44: N= 107  
Todas las veces: **54%**  
Casi siempre: **14%**  
A veces: **9%**  
Nunca: **23%**

45 a 54: N= 64  
Todas las veces: **55%**  
Casi siempre: **14%**  
A veces: **12%**  
Nunca: **19%**

55 a 69: N= 26  
Todas las veces: **46%**  
Casi siempre: **4%**  
A veces: **19%**  
Nunca: **31%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N= 41  
Todas las veces: **29%**  
Casi siempre: **12%**  
A veces: **30%**  
Nunca: **29%**

Primaria completa / Secundaria incompleta: N= 302  
Todas las veces: **53%**  
Casi siempre: **17%**  
A veces: **15%**  
Nunca: **15%**

Secundaria completa: N= 177  
Todas las veces: **76%**  
Casi siempre: **9%**  
A veces: **12%**  
Nunca: **3%**

Terciaria incompleta / Universitaria incompleta: N=161  
Todas las veces: **74%**  
Casi siempre: **11%**  
A veces: **9%**  
Nunca: **6%**

Terciaria completa / universitaria completa: N=60  
Todas las veces: **70%**  
Casi siempre: **15%**  
A veces: **10%**  
Nunca: **5%**

Por nivel de ingreso familiar

Ingreso bajo: N=404  
Todas las veces: **55%**

Casi siempre: **14%**  
A veces: **17%**  
Nunca: **14%**  
Ingreso medio: N=236  
Todas las veces: **74%**  
Casi siempre: **11%**  
A veces: **9%**  
Nunca: **6%**  
Ingreso alto: N=121  
Todas las veces: **70%**  
Casi siempre: **12%**  
A veces: **12%**  
Nunca: **6%**

## ***Quien sugirió el uso del preservativo la ultima vez en la pareja estable***

### ***Población general***

**2008.** Nacional (Jorrat, 2008) Nacional: N= 1228

Entrevistado: **16%**

La Pareja: **9%**

Ambos: **75%**

Por sexo:

Masculino: N= 604

Entrevistado: **21%**

La Pareja: **7%**

Ambos: **72%**

Femenino: N=624

Entrevistado: **12%**

La Pareja: **10%**

Ambos: **78%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=165

Entrevistado: **21%**

La Pareja: **10%**

Ambos: **69%**

20 a 24: N=311

Entrevistado: **21%**

La Pareja: **8%**

Ambos: **71%**

25 a 34: N=420

Entrevistado: **14%**

La Pareja: **8%**

Ambos: **78%**

35 a 44: N=215  
Entrevistado: **15%**  
La Pareja: **9%**  
Ambos: **76%**

45 a 54: N=100  
Entrevistado: **12%**  
La Pareja: **10%**  
Ambos: **78%**

55 a 69: N=17  
Entrevistado: **0%**  
La Pareja: **12%**  
Ambos: **88%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=35  
Entrevistado: **14%**  
La Pareja: **34%**  
Ambos: **52%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=416  
Entrevistado: **19%**  
La Pareja: **9%**  
Ambos: **72%**

Secundaria completa: N=314  
Entrevistado: **19%**  
La Pareja: **9%**  
Ambos: **72%**

Terciaria incompleta / Universitaria incompleta: N=280  
Entrevistado: **12%**  
La Pareja: **7%**  
Ambos: **81%**

Terciaria completa / Universitaria completa: N=183  
Entrevistado: **12%**  
La Pareja: **6%**  
Ambos: **82%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel Bajo: N=569  
Entrevistado: **19%**  
La Pareja: **9%**  
Ambos: **72%**

Nivel medio: N=470  
Entrevistado: **14%**  
La Pareja: **8%**  
Ambos: **78%**

Nivel alto: N=189  
Entrevistado: **15%**  
La Pareja: **8%**  
Ambos: **77%**

## **Quien sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja ocasional**

### **Población general**

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008). Nacional: N=611

Entrevistado: **52%**

La Pareja: **5%**

Ambos: **43%**

Por sexo:

Masculino: N=488

Entrevistado: **56%**

La Pareja: **5%**

Ambos: **39%**

Femenino: N=123

Entrevistado: **39%**

La Pareja: **5%**

Ambos: **56%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=108

Entrevistado: **56%**

La Pareja: **7%**

Ambos: **37%**

20 a 24: N=197

Entrevistado: **51%**

La Pareja: **5%**

Ambos: **44%**

25 a 34: N=174

Entrevistado: **55%**

La Pareja: **3%**

Ambos: **42%**

35 a 44: N=72

Entrevistado: **47%**

La Pareja: **3%**

Ambos: **50%**

45 a 54: N=47

Entrevistado: **51%**

La Pareja: **9%**

Ambos: **40%**

55 a 69: N=13

Entrevistado: **46%**

La Pareja: **0%**

Ambos: **54%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=21

Entrevistado: **62%**  
 La Pareja: **14%**  
 Ambos: **24%**  
 Primaria completa / Secundaria incompleta: N=239  
 Entrevistado: **55%**  
 La Pareja: **7%**  
 Ambos: **38%**  
 Secundaria completa: N=161  
 Entrevistado: **54%**  
 La Pareja: **5%**  
 Ambos: **41%**  
 Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=138  
 Entrevistado: **48%**  
 La Pareja: **1%**  
 Ambos: **51%**  
 Terciaria completa / universitaria completa: N=52  
 Entrevistado: **40%**  
 La Pareja: **2%**  
 Ambos: **58%**

Por nivel de ingreso familiar:  
 Nivel bajo: N=300  
 Entrevistado: **51%**  
 La Pareja: **6%**  
 Ambos: **43%**  
 Nivel medio: N=203  
 Entrevistado: **52%**  
 La Pareja: **4%**  
 Ambos: **44%**  
 Nivel alto: N= 108  
 Entrevistado: **57%**  
 La Pareja: **4%**  
 Ambos: **39%**

***Porcentaje que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses que usaron siempre preservativo para diferentes practicas sexuales por orientación sexual***

***Personas con VIH***

**2006.** Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Por orientación sexual  
 Mujeres: N=220



Para penetración vaginal: **66.4%**  
(% que realizó la practica): **98.6%**  
Para dar sexo oral: **38.8%**  
(% que realizo la practica): **72.7%**  
Para recibir sexo oral: **36.4%**  
(% que realizo la practica): **63.6%**  
Para dar penetración anal: **sin dato**  
(% que realizo la practica): **sin dato**  
Para recibir penetración anal: **68.8%**  
(% que realizo la practica): **56.8%**  
Cuando usa consoladores u otros objetos: **61.8%**  
(% que realizo la practica): **15.5%**

Varones heterosexuales: N=279

Para penetración vaginal: **72.7%**  
(% que realizó la practica): **99.6 %**  
Para dar sexo oral: **41.6%**  
(% que realizo la practica): **81.9%**  
Para recibir sexo oral: **50.0%**  
(% que realizo la practica): **84.8%**  
Para dar penetración anal: **70.1%**  
(% que realizo la practica): **72.8%**  
Para recibir penetración anal: **54.2%**  
(% que realizo la practica): **20.1%**  
Cuando usa consoladores u otros objetos: **41.4%**  
(% que realizo la practica): **21.0%**

GBT: N=175

Para penetración vaginal: **50.8%**  
(% que realizó la practica): **36.0%**  
Para dar sexo oral: **51.0%**  
(% que realizo la practica): **88.6%**  
Para recibir sexo oral: **53.9%**  
(% que realizo la practica): **86.9%**  
Para dar penetración anal: **82.5%**  
(% que realizo la practica): **88.0%**  
Para recibir penetración anal: **83.8%**  
(% que realizo la practica): **91.4%**  
Cuando usa consoladores u otros objetos: **54.2%**  
(% que realizo la practica): **27.4%**

## ***Uso del preservativo en la ultima relación sexual***

### ***Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)***

**2000-2001.** Buenos Aires. (Pando, 2003) N= 694

Parejas estables:

Uso regular del preservativo: **38.8%**  
Uso irregular del preservativo: **61.2%**

Parejas Ocasionales:

Uso regular del preservativo: **47%**  
Uso irregular del preservativo: **53%**

**2007** Bariloche Mar del Plata, Córdoba, Rosario y AMBA. (Barrón, 2008)  
N= 307 Varones= 219

Parejas estables:

La última vez que tuvo sexo anal utilizo preservativo?  
Si: **59.8%**  
La última vez que tuvo sexo oral utilizo preservativo?  
Si: **36.6%**

Por edad:

La última vez que tuvo sexo anal utilizo preservativo?  
< 23 años Si: **48.7%**  
24-27 años Si: **76%**  
La última vez que tuvo sexo oral utilizo preservativo?  
28- 35 años Si: **22.6%**  
>35 años Si: **46.2%**

Parejas Ocasionales:

La última vez que tuvo sexo anal utilizo preservativo?  
Si: **90.2%**  
La última vez que tuvo sexo oral utilizo preservativo?  
Si: **55.5%**

Por edad:

La última vez que tuvo sexo anal utilizo preservativo?  
< 23 años Si: **48.7%**  
24-27 años Si: **76%**

Uso de preservativo por sexo pago:

Utiliza preservativo cuando paga por sexo: **78%**  
Utiliza preservativo cuando cobra por sexo: **95%**.

## ***Población Trans***

**2007** Bariloche Mar del Plata, Córdoba, Rosario y AMBA. (Barrón,2008). N=88

Parejas estables:

La última vez que tuvo sexo anal utilizo preservativo?  
Si: **61.8%**  
La última vez que tuvo sexo oral utilizo preservativo?

Si: **50%**

Parejas Ocasionales:

La última vez que tuvo sexo anal utilizo preservativo?

Si: **95.3%**

La última vez que tuvo sexo oral utilizo preservativo?

Si: **83.5%**

## *Usuarios de drogas*

**2006-2008.** AMBA. (Salomón, 2008). N= 536

Parejas estables:

Siempre: **27.2%**.

Parejas ocasionales N=283

**64.3%**

Por sexo:

En hombres **61.5%** (126/205)

En mujeres **71.8%** (56/78)

Sexo pago:

En hombres: **73.6%** (39/53)

En el último año con clientes:

Nunca: **13,2%** (7/53)

A veces: **34,0%** (18/53)

Siempre: **52,8%** (28/53)

En el último año entre varones.

Nunca: **10,7%** (9/84)

A veces: **41,7%** (35/84)

Siempre: **46,4%** (39/84)

## ***Porcentaje que no utilizaron inconscientemente el preservativo en sus relaciones sexuales según motivos para no uso por orientación sexual***

### *Personas con VIH*

2006. Nacional. (Proyecto "Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina", 2008). N=351

Es incomodo: **21.7%**

No era necesario para esa practica: **21.4%**

Mi pareja no quiere: **13.1%**

No tienen grandes riesgos porque ambos son seropositivos: **9.7%**

No lo pensé, se dio así, se me olvido: **8.0%**

Era mi pareja estable: **7.4%**  
No tenia en ese momento: **7.1%**  
Gozo menos/pierdo sensibilidad: **6.0%**  
Por rebeldía inconsciencia: **4.3%**  
Estamos buscando un hijo: **3.4%**  
Da alegría: **2.6%**  
Se pierde la erección: **1.4%**  
Corta o interrumpe el momento: **1.1%**  
Estaba drogado, borracho: **1.1%**

Por orientación:

Mujer: N=126

Es incomodo: **14.3%**  
No era necesario para esa practica: **20.6%**  
Mi pareja no quiere: **26.2%**  
No tienen grandes riesgos porque ambos son seropositivos: **7.1%**  
No lo pensé, se dio así, se me olvido: **7.1%**  
Era mi pareja estable: **10.3%**  
No tenia en ese momento: **3.2%**  
Gozo menos/pierdo sensibilidad: **1.6 %**  
Por rebeldía inconsciencia: **2.4%**  
Estamos buscando un hijo: **4.8%**  
Da alegría: **3.2%**  
Se pierde la erección: **1.6%**  
Corta o interrumpe el momento: **0.8%**  
Estaba drogado, borracho: **0.0%**

Varón heterosexual: N=139

Es incomodo: **27.3%**  
No era necesario para esa practica: **24.5%**  
Mi pareja no quiere: **5.0%**  
No tienen grandes riesgos porque ambos son seropositivos: **12.9%**  
No lo pensé, se dio así, se me olvido: **7.2 %**  
Era mi pareja estable: **5.0%**  
No tenia en ese momento: **11.5%**  
Gozo menos/pierdo sensibilidad: **7.2 %**  
Por rebeldía inconsciencia: **2.2%**  
Estamos buscando un hijo: **3.6%**  
Da alegría: **2.2%**  
Se pierde la erección: **2.2%**  
Corta o interrumpe el momento: **1.4%**  
Estaba drogado, borracho: **0.7%**

GBT: N=86

Es incomodo: **23.3%**  
No era necesario para esa practica: **17.4%**  
Mi pareja no quiere: **7.0%**  
No tienen grandes riesgos porque ambos son seropositivos: **8.1%**

No lo pensé, se dio así, se me olvido:  
 Era mi pareja estable: **7.0%**  
 No tenía en ese momento: **5.8%**  
 Gozo menos/pierdo sensibilidad: **10.5 %**  
 Por rebeldía inconsciencia: **10.5%**  
 Estamos buscando un hijo: **1.2%**  
 Da alegría: **2.3%**  
 Se pierde la erección: **0.0%**  
 Corta o interrumpe el momento: **1.2%**  
 Estaba drogado, borracho: **3.5%**

## ***Motivo por el que no utilizo preservativo en la última relación sexual con pareja estable***

### ***Usuario de drogas***

**2007.** Mendoza, Rosario, Neuquén, AMBA (Mendes, 2007) N: 158

No tenían: **12.7 %**

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **15.6% N=45**

No participa en PRD: **12.1% N=107**

No sabe no contesta: **0 % N=6**

Por sexo:

Masculino: **15.6% N=122**

Femenino: **2.8 % N=36**

Por edad:

Hasta 24 años: **15.5 % N= 58**

25-34 años: **9.7 % N= 72**

35 años y más: **14.3% N= 28**

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **33.3 % N= 9**

Primaria completa-secundaria incompleta: **14 % N= 107**

Secundaria completa y más: **4.8% N= 42**

Pareja no quiso **10.8%**

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **13.6 % N=45**

No participa en PRD: **8.3% N=107**

No sabe no contesta: **33.3% N=6**

Sexo:

Masculino: **6.6 % N=122**

Femenino: **24.3% N=36**

Por edad:

Hasta 24 años: **5.2 % N= 58**

25-34 años: **13.9 % N= 72**

35 años y más: **14.3 % N= 28**

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **0% N= 9**

Primaria completa-secundaria incompleta: **12.1 %** N= 107  
Secundaria completa y más: **9.5%** N= 42

No le gusta usarlo **29.9%** N= 158

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **29.9 %** N=45

No participa en PRD: **27.9%** N=107

No sabe no contesta: **50%** N=6

Sexo:

Masculino: **30 %** N=122

Femenino: **29.7%** N=36

Por edad:

Hasta 24 años: **28.1 %** N= 58

25-34 años: **29.2 %** N= 72

35 años y más: **35.7 %** N= 28

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **55.6%** N= 9

Primaria completa-secundaria incompleta: **28.3 %** N= 107

Secundaria completa y más: **28.6%** N= 42

No pensó que era necesario **22.7%** N=158

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **20.9 %** N=45

No participa en PRD: **22.9%** N=107

No sabe no contesta: **33.3%** N=6

Sexo:

Masculino: **26.1 %** N=122

Femenino: **11.4%** N=36

Por edad:

Hasta 24 años: **18.8 %** N= 58

25-34 años: **23.6 %** N= 72

35 años y más: **28.6 %** N= 28

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **22.2%** N= 9

Primaria completa-secundaria incompleta: **24.3 %** N= 107

Secundaria completa y más: **19%** N= 42

No lo tuvo presente **8.6%** N=158

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **11.9%** N=45

No participa en PRD: **7.8%** N=107

No sabe no contesta: **0%** N=6

Sexo:

Masculino: **7.8 %** N=122

Femenino: **11.4%** N=36

Por edad:

Hasta 24 años: **13.2 %** N= 58

25-34 años: **2.9 %** N= 72

35 años y más: **14.3 %** N= 28

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **0%** N= 9  
Primaria completa-secundaria incompleta: **11 %** N= 107  
Secundaria completa y más: **4.8%** N= 42

No es natural **6%** N: 158

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **2.4 %** N=45

No participa en PRD: **7.8%** N=107

No sabe no contesta: **0%** N=6

Sexo:

Masculino: **7.8 %** N=122

Femenino: **0%** N=36

Por edad:

Hasta 24 años: **7.7 %** N= 58

25-34 años: **5.7 %** N= 72

35 años y más: **3.6 %** N= 28

Por nivel de instrucción

Hasta primaria incompleta: **12.5%** N= 9

Primaria completa-secundaria incompleta: **8 %** N= 107

Secundaria completa y más: **0%** N= 42

Quita placer **12.7%** N:158

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **14.3 %** N=45

No participa en PRD: **12.7%** N=107

No sabe no contesta: **0%** N=6

Sexo:

Masculino: **13 %** N=122

Femenino: **11.4%** N=36

Por edad:

Hasta 24 años: **17.3 %** N= 58

25-34 años: **11.4 %** N= 72

35 años y más: **7.1 %** N= 28

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **0%** N= 9

Primaria completa-secundaria incompleta: **16 %** N= 107

Secundaria completa y más: **7.1%** N= 42

Son pareja se tienen confianza **12%** N:158

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **19 %** N=45

No participa en PRD: **8.8%** N=107

No sabe no contesta: **16.7%** N=6

Sexo:

Masculino: **11.3 %** N=122

Femenino: **14.3%** N=36

Por edad:

Hasta 24 años: **9.6 %** N= 58

25-34 años: **12.9 %** N= 72

35 años y más: **14.3 %** N= 28

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **0%** N= 9

Primaria completa-secundaria incompleta: **15 %** N= 107

Secundaria completa y más: **7.1%** N= 42

La mujer toma pastillas **26%** N:158

Por Participación en programa de reducción de daños

Participa en PRD: **48.4 %** N=45

No participa en PRD: **49.1%** N=107

No sabe no contesta: **60%** N=6

Por Sexo :

Masculino: **24.3 %** N=122

Femenino: **31.4%** N=36

Por edad:

Hasta 24 años: **32.7 %** N= 58

25-34 años: **25.7 %** N= 72

35 años y más: **14.3 %** N= 28

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **12.5%** N= 9

Primaria completa-secundaria incompleta: **20 %** N= 107

Secundaria completa y más: **42.9%** N= 42



## Atención y tratamiento

### Análisis de CD4 y carga viral en los últimos 12 y 18 meses por región

#### Personas con VIH

**2006.** Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008). Total: N=841

CD4 en los últ 12 meses: **84.3%**

CD4 en los últ 18 meses: **91.9%**

Carga viral en los últ 12 meses: **82.2%**

Carga viral en los últ 18 meses: **90.4%**

CD4 y carga viral en los últ 12 meses: **77.9%**

CD4 y carga viral en los últ 18 meses: **86.7%**

Por región geográfica:

AMBA: N=486

CD4 en los últ 12 meses: **88.7%**

CD4 en los últ 18 meses: **95.1%**

Carga viral en los últ 12 meses: **84.4%**

Carga viral en los últ 18 meses: **90.7%**

CD4 y Carga viral en los últ 12 meses: **81.3%**

CD4 y carga viral en los últ 18 meses: **88.5%**

Pampeana: N=175

CD4 en los últ 12 meses: **73.7%**

CD4 en los últ 18 meses: **82.9%**

Carga viral en los últ 12 meses: **77.7%**

Carga viral en los últ 18 meses: **90.3%**

CD4 y Carga viral en los últ 12 meses: **68.6%**

CD4 y carga viral en los últ 18 meses: **80.0%**

Cuyo Patagonia: N=60

CD4 en los últ 12 meses: **93.3%**

CD4 en los últ 18 meses: **96.7%**

Carga viral en los últ 12 meses: **90.0%**

Carga viral en los últ 18 meses: **93.3%**

CD4 y Carga viral en los últ 12 meses: **88.3%**

CD4 y carga viral en los últ 18 meses: **91.7%**

NOA: N=60

CD4 en los últ 12 meses: **71.7%**

CD4 en los últ 18 meses: **86.7%**

Carga viral en los últ 12 meses: **68.3%**

Carga viral en los últ 18 meses: **81.7%**

CD4 y Carga viral en los últ 12 meses: **66.7%**

CD4 y carga viral en los últ 18 meses: **81.7%**

NEA: N=60

CD4 en los últ 12 meses: **83.3%**

CD4 en los últ 18 meses: **93.3%**

Carga viral en los últ 12 meses: **83.3%**

Carga viral en los últ 18 meses: **93.3%**

CD4 y Carga viral en los últ 12 meses: **78.3%**

CD4 y carga viral en los últ 18 meses: **91.7%**

## ***Frecuencia de concurrencia a consulta medica en los últimos 12 meses***

### ***Personas con VIH***

**2006.** Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Total: N=841

No concurrió en los últimos 12 meses: **0.4%**

Una vez: **6.3%**

Cada 6 meses: **9.5%**

Cada 4 meses: **6.3%**

Cada 3 meses: **19.4%**

Cada 2 meses: **12.5%**

Todos los meses: **33.9%**

Mas de una vez por mes: **9.8%**

Ns/NC: **2%**

AMBA: N=486

No concurrió en los últimos 12 meses: **0.4%**

Una vez: **8.2%**

Cada 6 meses: **9.1%**

Cada 4 meses: **7.4%**

Cada 3 meses: **21.0%**

Cada 2 meses: **12.1%**

Todos los meses: **31.1%**

Mas de una vez por mes: **8.6%**

Ns/NC: **2.1%**

Pampeana: N=175

No concurrió en los últimos 12 meses: **0.0%**

Una vez: **5.7%**

Cada 6 meses: **12.6%**

Cada 4 meses: **4.6%**

Cada 3 meses: **21.7%**

Cada 2 meses: **8.6%**

Todos los meses: **34.9%**

Mas de una vez por mes: **11.4%**

Ns/NC: **0.6%**

Cuyo Patagonia: N=60

No concurre en los últimos 12 meses: **0.0%**  
Una vez: **0.0%**  
Cada 6 meses: **5.0%**  
Cada 4 meses: **8.3%**  
Cada 3 meses: **8.3%**  
Cada 2 meses: **31.7%**  
Todos los meses: **40.0%**  
Mas de una vez por mes: **5.0%**  
Ns/NC: **1.7%**

NOA: N=60

No concurre en los últimos 12 meses: **0.0%**  
Una vez: **0.0%**  
Cada 6 meses: **10.0%**  
Cada 4 meses: **6.7%**  
Cada 3 meses: **3.3%**  
Cada 2 meses: **1.7%**  
Todos los meses: **48.3%**  
Mas de una vez por mes: **23.3%**  
Ns/NC: **6.7%**

NEA: N=60

No concurre en los últimos 12 meses: **1.7 %**  
Una vez: **5.0%**  
Cada 6 meses: **8.3%**  
Cada 4 meses: **0.0%**  
Cada 3 meses: **26.7%**  
Cada 2 meses: **18.3%**  
Todos los meses: **33.3%**  
Mas de una vez por mes: **5.0%**  
Ns/NC: **1.7%**

## **Comienzo de TARV**

### **Personas con VIH**

**2006.** Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Total: N=841

Si actualmente sigue un tratamiento (y nunca lo interrumpió por un tiempo prolongado): **59.6%**  
Si, lo empezó, lo interrumpió por un tiempo y ahora lo está siguiendo: **15.9%**  
Si, empezó pero no lo esta siguiendo en este momento: **7.6%**  
Nunca le dijeron de empezar un tratamiento: **15.9%**  
Ns/nc: **1.0%**

Por región:

AMBA: N=486

Si actualmente sigue un tratamiento y nunca lo interrumpió por un tiempo prolongado): **68.9%**

Si, lo empezó, lo interrumpió por un tiempo y ahora lo está siguiendo: **9.5%**  
 Si, empezó pero no lo esta siguiendo en este momento: **5.6%**  
 Nunca le dijeron de empezar un tratamiento: **14.6%**  
 Ns/nc: **1.4%**

Pampeana: N=175  
 Si actualmente sigue un tratamiento y nunca lo interrumpió por un tiempo prolongado): **52.0%**  
 Si, lo empezó, lo interrumpió por un tiempo y ahora lo está siguiendo: **18.3%**  
 Si, empezó pero no lo esta siguiendo en este momento: **9.7%**  
 Nunca le dijeron de empezar un tratamiento: **19.4%**  
 Ns/nc: **0.6%**

Cuyo Patagonia: N=60  
 Si actualmente sigue un tratamiento y nunca lo interrumpió por un tiempo prolongado): **30.0%**  
 Si, lo empezó, lo interrumpió por un tiempo y ahora lo está siguiendo: **41.7%**  
 Si, empezó pero no lo esta siguiendo en este momento: **16.7%**  
 Nunca le dijeron de empezar un tratamiento: **11.7%**  
 Ns/nc: **0.0%**

NOA: N=60  
 Si actualmente sigue un tratamiento y nunca lo interrumpió por un tiempo prolongado): **31.7%**  
 Si, lo empezó, lo interrumpió por un tiempo y ahora lo está siguiendo: **38.3%**  
 Si, empezó pero no lo esta siguiendo en este momento: **15.0%**  
 Nunca le dijeron de empezar un tratamiento: **15.0%**  
 Ns/nc: **0.0%**

NEA: N=60  
 Si actualmente sigue un tratamiento y nunca lo interrumpió por un tiempo prolongado): **63.3%**  
 Si, lo empezó, lo interrumpió por un tiempo y ahora lo está siguiendo: **13.3%**  
 Si, empezó pero no lo esta siguiendo en este momento: **1.7%**  
 Nunca le dijeron de empezar un tratamiento: **21.7%**  
 Ns/nc: **0.0%**

## ***Periodo en que comenzaron TARV por región***

### ***Personas con VIH***

**2006. Nacional.** (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Total: N=699

1996-1999: **31.9%**

2000-2003: **33.5%**

2004 en adelante (-2006): **27.2%**

No recuerda: **7.4%**

Por región:

AMBA: N=408

1996-1999: **32.4%**

2000-2003: **33.1%**

2004 en adelante (-2006): **26.7%**

No recuerda: **7.8%**

Pampeana: N=140

1996-1999: **38.6%**

2000-2003: **29.3%**

2004 en adelante (-2006): **21.4%**

No recuerda: **10.7%**

Cuyo Patagonia: N=53

1996-1999: **39.6%**

2000-2003: **43.4%**

2004 en adelante (-2006): **13.2%**

No recuerda: **3.8%**

NOA: N=51

1996-1999: **19.6%**

2000-2003: **29.4%**

2004 en adelante (-2006): **47.1%**

No recuerda: **3.9%**

NEA: N=47

1996-1999: **12.8%**

2000-2003: **42.6%**

2004 en adelante (-2006): **42.6%**

No recuerda: **2.1%**

## Estigma y discriminación

### **Porcentaje que declaran haber sufrido rechazo o discriminación de parte de algún familiar, amigo/a, compañeros/as de trabajo**

#### *Poblacion General*

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008)

Actitudes discriminatorias en relación con las personas que viven con VIH

Total: N=4000

Alta: **38%** Media: **26%** Baja: **36%**

Por sexo:

Masculino: N=1995

Alta: **40%** Media: **25%** Baja: **35%**

Femenino: N=2005

Alta: **36%** Media: **27%** Baja: **37%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=492

Alta: **53%** Media: **22%** Baja: **25%**

20 a 24: N=745

Alta: **42%** Media: **25%** Baja: **32%**

25 a 34: N=1123

Alta: **29%** Media: **28%** Baja: **43%**

35 a 44: N=765

Alta: **33%** Media: **29%** Baja: **38%**

45 a 54: N=543

Alta: **37%** Media: **24%** Baja: **39%**

55 a 69: N=332

Alta: **50%** Media: **23%** Baja: **27%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=226

Alta: **64%** Media: **14%** Baja: **22%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=1644

Alta: **46%** Media: **24%** Baja: **30%**

Secundaria completa: N=883

Alta: **35%** Media: **27%** Baja: **38%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=699

Alta: **25%** Media: **31%** Baja: **44%**

Terciaria completa / universitaria completa: N=548

Alta: **25%** Media: **28%** Baja: **47%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel Bajo: N= 2038

Alta: **43%** Media: **25%** Baja: **32%**

Nivel medio: N=1377

Alta: **34%** Media: **27%** Baja: **39%**

Nivel alto: N= 585

Alta: **30%** Media: **27%** Baja: **43%**

## **Percepción de discriminación**

### **Personas con VIH**

**2006.** Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Total: N=799

Por su propia familia N= 799

Alguna vez: **17.0%**

En los últimos 12 meses: **6%**

Por amigos cercanos: N=782

Alguna vez: **14.1%**

En los últimos 12 meses: **4.7%**

Por compañeros de trabajo: N=614

Alguna vez: **11.2%**

En los últimos 12 meses: **2.9%**

Por personas con las que tuvo o quería tener relaciones sexuales:

N=748

Alguna vez: **15.9%**

En los últimos 12 meses: **5.6%**

Por región geográfica:

AMBA:

Por su propia familia N= 467

Alguna vez: **14.6%**

En los últimos 12 meses: **4.1%**

Por amigos cercanos: N=457

Alguna vez: **12.7%**

En los últimos 12 meses: **3.7%**

Por compañeros de trabajo: N=376

Alguna vez: **10.1%**

En los últimos 12 meses: **2.7%**

Por personas con las que tuvo o quería tener relaciones sexuales: N=443

Alguna vez: **13.1%**

En los últimos 12 meses: **4.3%**

Pampeana:

Por su propia familia N= 162

Alguna vez: **16.7%**

En los últimos 12 meses: **9.3%**

Por amigos cercanos: N=163

Alguna vez: **11.7%**

En los últimos 12 meses: **6.1%**

Por compañeros de trabajo: N=117

Alguna vez: **15.4%**

En los últimos 12 meses: **4.3%**

Por personas con las que tuvo o quería tener relaciones sexuales: N=140

Alguna vez: **20.7%**

En los últimos 12 meses: **7.1%**

Cuyo Patagonia:

Por su propia familia N= 59

Alguna vez: **16.9%**

En los últimos 12 meses: **10.2%**

Por amigos cercanos: N=57

Alguna vez: **21.1%**

En los últimos 12 meses: **0.0%**

Por compañeros de trabajo: N=46

Alguna vez: **8.7%**

En los últimos 12 meses: **2.2%**

Por personas con las que tuvo o quería tener relaciones sexuales: N=56

Alguna vez: **12.5%**

En los últimos 12 meses: **5.4%**

NOA:

Por su propia familia: N= 58

Alguna vez: **24.1%**

En los últimos 12 meses: **10.3%**

Por amigos cercanos: N=51

Alguna vez: **17.6%**

En los últimos 12 meses: **7.8%**

Por compañeros de trabajo: N=34

Alguna vez: **11.8%**

En los últimos 12 meses: **2.9%**

Por personas con las que tuvo o quería tener relaciones sexuales: N=57

Alguna vez: **34.6%**

En los últimos 12 meses: **13.5%**

NEA:

Por su propia familia N= 53

Alguna vez: **32.1%**

En los últimos 12 meses: **11.3%**

Por amigos cercanos: N=54

Alguna vez: **22.2%**

En los últimos 12 meses: **11.1%**

Por compañeros de trabajo: N=41



Alguna vez: **12.2%**  
En los últimos 12 meses: **2.4%**  
Por personas con las que tuvo o quería tener relaciones sexuales: N=52  
Alguna vez: **34.6%**  
En los últimos 12 meses: **13.5%**

## **Porcentaje que declararon haberse sentido discriminados en servicios de salud**

### **Personas con VIH**

**2006.** Nacional. (Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y control del VIH/Sida en Argentina”, 2008)

Total: N=841

Alguna vez sintió rechazo discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por el hecho de ser una persona viviendo con VIH:

**22.9%**

En los últimos 12 meses sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por el hecho de ser una persona viviendo con VIH:

**10.2%**

Alguna vez sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por otros motivos (no relacionado con ser PVVS):

**13.7%**

En los últimos 12 meses sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por otros motivos (no relacionado con ser PVVS):

**5.9%**

Por región geográfica:

AMBA: N=486

Alguna vez sintió rechazo discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por el hecho de ser una persona viviendo con VIH:

**17.7%**

En los últimos 12 meses sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por el hecho de ser una persona viviendo con VIH:

**7.4%**

Alguna vez sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por otros motivos (no relacionado con ser PVVS):

**13.4%**

En los últimos 12 meses sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por otros motivos (no relacionado con ser PVVS):

**4.7%**

Pampeana: N=175

Alguna vez sintió rechazo discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por el hecho de ser una persona viviendo con VIH:

**28.0%**

En los últimos 12 meses sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por el hecho de ser una persona viviendo con VIH:

**13.1%**

Alguna vez sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por otros motivos (no relacionado con ser PVVS):

**11.4%**

En los últimos 12 meses sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por otros motivos (no relacionado con ser PVVS):

**8.0%**

Cuyo Patagonia: N=60

Alguna vez sintió rechazo discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por el hecho de ser una persona viviendo con VIH:

**35.0%**

En los últimos 12 meses sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por el hecho de ser una persona viviendo con VIH:

**11.7%**

Alguna vez sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por otros motivos (no relacionado con ser PVVS):

**25.0%**

En los últimos 12 meses sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por otros motivos (no relacionado con ser PVVS):

**5.0%**

NOA: N=60

Alguna vez sintió rechazo discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por el hecho de ser una persona viviendo con VIH:

**35.0%**

En los últimos 12 meses sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por el hecho de ser una persona viviendo con VIH:

**18.3%**

Alguna vez sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por otros motivos (no relacionado con ser PVVS):

**10.0%**

En los últimos 12 meses sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por otros motivos (no relacionado con ser PVVS):

**6.7%**

NEA: N=60

Alguna vez sintió rechazo discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por el hecho de ser una persona viviendo con VIH:

**26.7%**

En los últimos 12 meses sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por el hecho de ser una persona viviendo con VIH:

**15.0%**

Alguna vez sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por otros motivos (no relacionado con ser PVVS):

**15.0%**

En los últimos 12 meses sintió rechazo, discriminación o prejuicio por parte de médicos o personal de salud por otros motivos (no relacionado con ser PVVS):

**10.0%**

## ***Grado de tradicionalidad en actitudes hacia el genero y la homosexualidad***

### ***Población General***

**2008.** Nacional. (Jorrat, 2008). Total: N= 4000

Nada tradicional: **38%**

Algo tradicional: **57%**

Muy tradicional: **5%**

Por sexo

Masculino: N=1995

Nada tradicional: **35%**

Algo tradicional: **60%**

Muy tradicional: **5%**

Femenino: N=2005

Nada tradicional: **41%**

Algo tradicional: **53%**

Muy tradicional: **6%**

Por grupo de edad:

15 a 19: N=492

Nada tradicional: **38%**

Algo tradicional: **55%**

Muy tradicional: **7%**

20 a 24: N=745  
Nada tradicional: **43%**  
Algo tradicional: **53%**  
Muy tradicional: **4%**

25 a 34: N= 1134  
Nada tradicional: **43%**  
Algo tradicional: **53%**  
Muy tradicional: **4%**

35 a 44: N= 765  
Nada tradicional: **38%**  
Algo tradicional: **57%**  
Muy tradicional: **5%**

45 a 54: N=543  
Nada tradicional: **29%**  
Algo tradicional: **65%**  
Muy tradicional: **6%**

55 a 69: N= 332  
Nada tradicional: **22%**  
Algo tradicional: **69%**  
Muy tradicional: **9%**

Por nivel de instrucción:

Primaria incompleta: N=226  
Nada tradicional: **18%**  
Algo tradicional: **76%**  
Muy tradicional: **6%**

Primaria completa / secundaria incompleta: N=1644  
Nada tradicional: **29%**  
Algo tradicional: **64%**  
Muy tradicional: **7%**

Secundaria completa: N=883  
Nada tradicional: **42%**  
Algo tradicional: **54%**  
Muy tradicional: **4%**

Terciaria incompleta / universitaria incompleta: N=699  
Nada tradicional: **49%**  
Algo tradicional: **48%**  
Muy tradicional: **3%**

Terciaria completa / universitaria completa: N= 548  
Nada tradicional: **51%**  
Algo tradicional: **45%**  
Muy tradicional: **4%**

Por nivel de ingreso familiar:

Nivel bajo: N=2038  
Nada tradicional: **33%**  
Algo tradicional: **61%**  
Muy tradicional: **6%**

Nivel medio: N=1377  
Nada tradicional: **43%**

Algo tradicional: **53%**  
Muy tradicional: **4%**  
Nivel alto: N=585  
Nada tradicional: **44%**  
Algo tradicional: **51%**  
Muy tradicional: **5%**

## ***Grado de Discriminación hacia las personas con sida***

### ***Usuario de drogas***

**2007.** Rosario, Mendoza, Neuquén, AMBA (Mendes, 2008)  
N=289

Bajo: **49.5%** N=289

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **56.9%** N=72

No participa en PRD: **47.3%** N=207

No sabe no contesta: **40%** N=10

Sexo:

Masculino: **47.5%** N=238

Femenino: **58.8%** N=51

Por edad:

Hasta 24 años: **40.7%** N= 145

25-34 años: **59.2%** N= 103

35 años y más: **56.1%** N= 41

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **46.7%** N= 30

Primaria completa-secundaria incompleta: **46.3%** N= 193

Secundaria completa y más: **60.6%** N= 66

Medio: **24.6%** N=289

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **20.8%** N=72

No participa en PRD: **25.6%** N=207

No sabe no contesta: **30%** N=10

Sexo:

Masculino: **25.8%** N=238

Femenino: **21.6%** N=51

Por edad:

Hasta 24 años: **23.4%** N= 145

25-34 años: **22.3%** N= 103

35 años y más: **34.1%** N= 41

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **10%** N= 30

Primaria completa-secundaria incompleta: **26.4%** N= 193

Secundaria completa y más: **25.8%** N= 66

Alto: **26%** N=289

Por Participación en programa de reducción de daños:

Participa en PRD: **22.2%** N=72

No participa en PRD: **27.2%** N=207

No sabe no contesta: **30%** N=10

Sexo:

Masculino: **27.3%** N=238

Femenino: **19.6%** N=51

Por edad:

Hasta 24 años: **35.9%** N= 145

25-34 años: **18.4%** N= 103

35 años y más: **9.8%** N= 41

Por nivel de instrucción:

Hasta primaria incompleta: **43.3%** N= 30

Primaria completa-secundaria incompleta: **27.7%** N= 193

Secundaria completa y más: **13.8%** N= 66

# Estadísticas Nacionales

## Políticas Nacionales (Marco Juridico)

### Nacionales:

- Constitución Nacional
- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Convención sobre los Derechos del Niño
- Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación de la Mujer
- Convención Americana sobre Derechos Humanos
- Código Penal
- Código Civil
- Código Procesal Penal de la Nación
- Ley 17.131 Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades de colaboración
- Ley 17.677 Convención relativa a la Discriminación en materia de empleo y ocupación
- Ley 19587 Higiene y Seguridad en el trabajo 1972
- Ley 20.774 Ley de Contrato de Trabajo 1975
- Ley 22.990 Sangre Humana 1983
- Ley 23.592 Discriminación. Actos u omisiones discriminatorios 1988
- Ley 23.660 Obras sociales 1989
- Ley 23.661 Sistema Nacional de Seguro Social 1989
- Ley 23.798 Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA 1989
- Ley 24.004 Ejercicio de la Enfermería 1991
- Ley 22.241 Prestaciones previsionales 1993
- Ley 24.455 Cobertura en las Obras Sociales a Enfermos de SIDA y Droga dependientes 1995
- Ley 24.557 Riesgos en el Trabajo 1995
- Ley 24.754 Prestaciones Obligatorias 1997
- Ley 24.660 Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad
- Decreto 1058-97 Ministerio de Justicia
- Decreto 1.244-90 Reglamento de la Ley 27.798-89
- Decreto 385-89 Constituyese la Comisión Nacional de Lucha contra el SIDA en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social
- Decreto 478-98 Normas para Evaluación, Calificación y Cuantificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
- Decreto 906-95 Fuerzas Armadas y Seguridad
- Decreto 580-95 Reglamento Ley 24.455
- Decreto 1023-94 Reglamento de Migraciones
- Decreto 375-89 Regulación de las Actividades relacionadas con la sangre humana, sus componentes, derivados y subproductos - Reglamentación de la Ley 22.990
- Resolución 18-92
- Resolución Secretarial 228-93 Anexo II Recomendaciones de Bioseguridad para Laboratorios de Diagnóstico e Investigación que trabajen con Materiales biológicos.
- Resolución Secretarial 105-97 Normas de SIDA en Perinatología (Ministerio de Salud)
- Resolución Secretarial 19-98 Normas de notificaciones de accidente laboral y atención del personal de la Salud con Riesgo de infección por Patógenos Sanguíneos (Ministerio de Salud)
- Resolución Secretarial 17-99 Recomendaciones provisorias para indicación de la terapia antirretroviral. (Ministerio de Salud)
- Resolución Ministerial 787=91 Política Normativa en relación a la Infección de HIV en los Servicios Carcelarios Federales.
- Resolución ministerial 247-96 Programa Médico Obligatorio (Ministerio de Salud)
- Resolución ministerial 702-93 Normas de medicina Transfusional (Ministerio de Salud)



- Resolución Ministerial 365-99 Modificación a las normas de medicina transfusional
- Resolución ANSSAL 709-97 Seguro de Salud = Programa de cobertura del Alta Complejidad - Modificación - Enfermos de SIDA y drogadicción - coberturas.

## **Provinciales**

### **Buenos Aires**

- Ley 10.636 Denuncia obligatoria de los casos de Síndrome de Inmuno deficiencia Adquirida SIDA 1988
- Ley 10.721 1988
- Ley 10.721 1988
- Ley 11.506-1994
- Decreto 1.582-89 Servicio Penitenciario
- Decreto 1.758-96 Reglamentación Ley 11.506
- Decreto 1.902-90

### **Catamarca**

- Ley 4.502- 1988
- Ley 4.752 Material descartable. Reutilización. Prohibición 1992

### **Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

- Ley 153. Ley Básica de Salud
- Ordenanza 18.160 Enfermedades infecto contagiosas 1961
- Ordenanza 42=248 Programa de difusión a equipos de salud 1987
- Ordenanza 44.414 Análisis de sangre previa transfusión a Servicios de Hemoterapia municipales 1990
- Ordenanza 44.415 Detección de sangre previa transfusión 1990
- Ordenanza 45.381 Declaración de interés municipal la lucha contra el SIDA 1992
- Ordenanza 45.566 Creación del Centro Municipal de Conformación para el diagnóstico serológico HIV 1992
- Ordenanza 51.189 Prevención del SIDA Maquinas expendedoras de preservativos – Obligatoriedad
- Decreto 5.897.92
- Decreto 189-95 Establece que la Secretaria de Salud será la responsable de la puesta en marcha del Programa Municipal de Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
- Resolución 43.761 Campaña de difusión 1989

## **CORDOVA**

- Ley 6.222 Ejercicio de las profesiones y actividades relacionadas con la salud humana 1978
- Ley 6.392 – 1987
- Ley 7.714 Prevención y Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual 1988

## **CORRIENTES:**

- Ley 4.449 – 1990

## **CHACO**

- LEY 3.515 – 1989
- LEY 3.516 Normas para la prevención, control y asistencia integral de las enfermedades de transmisión sexual 1989
- Ley 3.617 Establecimientos educativos. Enseñanza sobre el SIDA. Efectos y prevenciones 1990

- Ley 3.904 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA. Prevención. Regime. Adhesión 1993

## **CHUBUT**

- Ordenanza 1.131-90 Puerto Madryn
- Ordenanza 289-94 Rawson

## **ENTRE RIOS**

- Ordenanza 3.402-90 Concepción del Uruguay

## **FORMOSA**

- Ley 1.042 = 1993
- Decreto 1.210-93

## **JUJUY**

- Ley 4.451- Lucha contra el SIDA 1989

## **LA PAMPA**

- Ley 1.112 Prevención y Lucha contra el SIDA 1988
- Decreto 680-90
- Decreto 2.952-Prevención y lucha contra el SIDA. Reglamentación.

## **LA RIOJA**

- Ley 5.826- 1992
- Decreto 595-92
- Decreto 90-92
- Ordenanza 1.782-89

## **MENDOZA**

- Ley 4.872 – 1983
- Ley 5.714 – 1991
- Decreto 1.757-91
- Resolución 1.205-93
- Resolución 81-94

## **MISIONES**

- Ley 2.754 Síndrome de inmunodeficiencia Adquirida SIDA. Programa de Control 1990
- Ley 3.012 - 1990

## **NEUQUEN**

- Ley 1.922 - 1991

## **RIO NEGRO**

- Ley 2.393- 1990
- Ley 3.157-98
- Decreto 2.288-92 Reglamento Ley 2393
- Resolución 2.597-93 Normas de bioseguridad

## **SALTA**

- Ley 6.660 Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA. Control y Prevención 1992

## ***SAN JUAN***

- Ley 5.923 – 1988
- Ley 6.320 Esterilización de Instrumental. Prevención del SIDA Obligatoriedad 1993
- Ley 6794-97

## ***SAN LUIS***

- Ley 4.883-1990
- Resolución 165-91

## ***SANTA CRUZ***

- Ley 2.330=1993
- Ordenanza 1.144-93 Río Gallegos

## ***SANTA FE***

- Ley 11.460= 1996
- Decreto 1812-97

## ***SANTIAGO DEL ESTERO***

- Ley 5.666 Se declara de interés provincial la lucha contra la enfermedad conocida como
- Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA 1988

## ***TIERRA DEL FUEGO***

- Ley 385 – 1989
- Resolución 254-89

## ***TUCUMAN***

- Decreto- Acuerdo 181-21-Nas 1994
- Resolución 509-21-Mas- 1994

## Bibliografía Consultada

1. Barrón López, Sara. *Micaela Libson Renata Hiller* Estudio social en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) Relevamiento 2007. Investigación realizada en el marco del Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y Control del VIH/Sida en Argentina” Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. UBATEC. SA. 2008
2. Chambi, Jorge Omar. Cardozo, Maria. Coello, Yanina. Durán, Roxana. Las chicas trans nos cuidamos Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y Control del VIH/Sida en Argentina” Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Ubatec SA. 2008
3. María Delia Péné, Juan Adrián Sotelo, Marina Claudia Khoury, ESTUDIO SOBRE SEROPREVALENCIA DE VIH EN PERSONAS TRANS (Travestis/Transexuales/Transgénero) Y SU ASOCIACIÓN A PRÁCTICAS DE RIESGO Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y Control del VIH/Sida en Argentina” Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Ubatec SA. 2006.
4. Jorrat, Jorge Raul. Actitudes, Información y Conductas en relación con el VIH/sida en la población general. Argentina 2008. Buenos Aires, UBATEC S.A. 2008.
5. Maulen, Sergio. Línea de base en hombres que tienen sexo con hombres. Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y Control del VIH/Sida en Argentina” Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. UBATEC SA. 2004
6. Ministerio de Salud Actualización de la respuesta estratégica al VIH/sida de Argentina: hacia el acceso universal a la prevención, tratamiento atención y apoyo. 2008 - 2011. Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual.
7. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS República Argentina BOLETIN SOBRE EL VIH/ SIDA EN LA ARGENTINA AÑO XI – NUMERO 24 – SEPTIEMBRE 2005
8. Ministerio de Salud. Boletín sobre el VIH-SIDA en la Argentina. Año XI, Número 25 Agosto 2008
9. OPS. Digesto de Leyes Nacionales y Provinciales de la República Argentina sobre VIH/SIDA. Actualización a diciembre 1999. Oficina Panamericana de la Salud. 1999
10. Pando María, Sergio Maulen, Mercedes Weissenbacher, Rubén Marone, Ricardo Duranti, Liliana Martínez Peralta, Horacio Salomón, Kevin Russell, Monica Negrete, Sergio Sosa Estani, Silvia Montano, José L Sanchez and Maria Mercedes Ávila. High human immunodeficiency virus type 1 seroprevalence in men who have sex with men in Buenos Aires, Argentina: risk factors for infection *International Journal of Epidemiology* 2003;32:735–740
11. Pando, María. Christian T. Bautista, Sergio Maulen, Ricardo Duranti, Rubén Marone, Jorge Rey, Moira Vignoles, María E. Eirin, Mirna M. Biglione, Gloria Griemberg, Silvia M. Montano, Jean K. Carr, Jose L. Sánchez and María M. Avila. *Epidemiology of Human Immunodeficiency Virus, Viral Hepatitis (B and C), Treponema pallidum, and Human T-Cell Lymphotropic I/II Virus Among Men Who Have Sex With Men in Buenos Aires, Argentina Sexually Transmitted Diseases*, May 2006, Vol. 33, No. 5, p.000–000
12. Pando María, Carolina Berini, Mariel Bibini, Mauro Fernandez, Elena Reinaga, Sergio Maulen, Ruben Marone, Mirna Biglione, Silvia M. Montano, Christian T. Bautista, Mercedes Weissenbacher, Jose L. Sanchez, and Maria M. Avila

13. PREVALENCE OF HIV AND OTHER SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS AMONG FEMALE COMMERCIAL SEX WORKERS IN ARGENTINA *Am. J. Trop. Med. Hyg.*, 74(2), 2006, pp. 233–238
14. Péné Maria, Juan Adrián Sotelo, Marina Claudia Khoury, ESTUDIO SOBRE SEROPREVALENCIA DE VIH EN PERSONAS TRANS (Travestis/Transexuales/Transgénero) Y SU ASOCIACIÓN A PRÁCTICAS DE RIESGO Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y Control del VIH/Sida en Argentina” Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Ubatec SA. 2006.
15. Proyecto de Actividades de Apoyo para la Prevención y Control del VIH/SIDA en Argentina. Estudio Nacional sobre la Situación Social de las Personas Viviendo con VIH en la Argentina.. Buenos Aires. 2008
16. Saavedra, Laura. Sistematización de experiencias del Proyecto País 2007. Ciudad Autónoma de Buenos Aires UBATEC SA 2008.
17. Segura M, S Maulen, S Sosa Estani<sup>1</sup>, M Fernandez , R Marone , JL Sanchez , M Weissenbacher, and MM Avila. Further vaccine related analysis of the Buenos Aires men who have sex with men (MSM) cohort. Argentina. Poster 2003.
18. Toibaro Javier, Juan Ebreñstejin, Angel Parlante, Patricia Burgoa, Marcelo H. Losso Infecciones de Transmisión Sexual en personas transgénero y otras identidades sexuales
19. *In press. Revista Medicina*
20. Toibaro Javier, Juan Ebreñstejin, Angel Parlante, Patricia Burgoa, Marcelo H. Losso Programa de prevención y diagnóstico precoz de la infección por VIH y enfermedades de transmisión sexual en la población trans (travesti, trans género, transexual) en la ciudad de Buenos Aires. Proyecto “Actividades de Apoyo para la Prevención y Control del VIH/Sida en Argentina” Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Ubatec SA. 2007-2008.

## Autores

Amante L, 6  
Avila M, 27, 28  
Avila S, 25  
Barchetta S, 24  
Barrionuevo O, 21  
Barrón López S, 32  
Baudracco C, 39  
Bernstein J, 21  
Burke Viale C, 24  
Carioli N, 32  
Castro C, 18  
Chamba J, 38  
Cilia N, 20  
Colombo E, 8  
Couto I, 36  
Donaire J, 6  
Durante R, 28  
Epele M E, 20  
Estani S, 27, 28  
Fernandez M, 27  
Freyre A, 39  
Fuentes S, 6  
García M, 6  
Giaccaglia M, 20  
Gómez Carrillo M, 25  
Guffanti S, 2  
Hiller R, 32  
Jorrat J, 36  
Khoury M, 39  
Koblit A, 2, 36  
Libson M, 32  
Mamani N, 23  
Marone R, 25, 27, 28  
Márquez J C, 6  
Martinez-Peralta L, 28  
Maulen S, 27  
Montano S, 28  
Morasso M, 18  
Motta I, 8  
Muiños R, 39  
Negrete M, 28  
Oudshoorn S, 20  
Pampuro S, 25  
Pando M, 25, 28  
Pecheny M, 16  
Pene M D, 10, 13, 24, 39  
into G, 18

Redi Freundlich M C, 20  
Risueño A, 8  
Rodriguez M, 18  
Romero M, 39  
Rossi D, 25, 28  
Russell K, 28  
Salomón H, 25, 28  
Sanchez J, 27, 28  
Scandizzo E, 21  
Segural M, 27  
Sotelo J, 24, 39  
Soza M E, 6  
Terrones C, 7  
Valzacchi B, 20  
Varela C, 6  
Vázquez G, 20  
Vila M, 24, 25  
Weissebacher M, 27, 28  
Yave J, 6  
Zapatela M, 25

## Acrónimos

AMBA:	Area Metropolitana de Buenos Aires.
GBT:	Gay, Bisexual, Trans.
HSH:	Hombres que tienen sexo con hombres.
IC:	Intervalo de confianza.
IDU:	Siglas en ingles de: Usuario de Drogas Intravenosas.
ITS:	Infecciones de Transmisión Sexual.
N:	Tamaño de la población.
Nc:	No contestó.
NEA:	Nor este Argentino.
NOA:	Nor oeste argentino.
NS:	No sabe.
OR:	Odd ratio
PRD:	Programa de Reducción de Daño
TS:	trabajador(a) sexual.
VIH:	Virus de Inmunodeficiencia Humana.
SIDA:	Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.

## **Anexos: Tablas y Graficas**